

Val av vaccin vid påfyllnadsdos (tredje dos) av covid-19 vaccin

Region Skåne följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilka grupper som erbjuds påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. **Som påfyllnadsdos ges mRNA-vaccin, antingen en dos 30 mikrogram = 0.3 ml Comirnaty (Pfizer) eller en halv dos 50 mikrogram = 0.25 ml Spikevax (Moderna).** För personer som är äldre än 30 år är dessa två vaccin utbytbara och kan ges oberoende av vilket vaccin som getts vid tidigare doser.

Då stora grupper är aktuella för en påfyllnadsdos den närmaste tiden måste tillgängligt vaccin användas optimalt. Detta för att undvika kassation och bristsituationer. Både Spikevax (Moderna) och Comirnaty (Pfizer) måste användas till personer som är äldre än 30 år. I nuläget måste alla vaccinerande enheter i huvudsak använda Spikevax (Moderna) där så är möjligt (vaccination av individer som är äldre än 30 år) både som påfyllnadsdos och nyvaccination. Detta för att undvika vaccinbrist och kassation.

För val av vaccin vid påfyllnadsdos gäller följande:

- Påfyllnadsdosen ges tidigast fem månader efter senaste dos av covidvaccin till personer som är 65 år eller äldre.
- Påfyllnadsdosen ges tidigast sex månader efter senaste dos av covidvaccin till personer som är yngre än 65 år.
- För personer som är äldre än 30 år ges antingen en halv dos Spikevax (Moderna) eller en hel dos Comirnaty (Pfizer) som påfyllnadsdos oavsett vilket vaccin som getts tidigare. Dessa bägge vaccin är utbytbara. Vi erbjuder inte möjlighet för patienten att själv välja vaccin.
- Till individer som är 30 år eller yngre ges en hel dos Comirnaty (Pfizer) som påfyllnadsdos oavsett vilket vaccin som getts tidigare.
- För personer som tidigare haft covid-19 infektion gäller att de kan vaccineras med en tredje dos oavsett om de hade infektionen innan de blev fullvaccinerade eller efter att de blivit vaccinerade med två doser (s.k genombrottsinfektion). Personen ska ha tillfrisknat från covidinfektion innan personen kan vaccineras.