


<b>Region Skåne</b> <b>Område Läkemedel</b> <b>Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret</b>				
<b>Iordningställande av</b> <b>administreringssprutor för Pfizer</b> <b>COVID-19 Vaccin Comirnaty</b>	<b>Dokumenttyp</b> Vägledande		<b>Gäller fr.o.m</b> 2021-02-04	
	<b>Dokumentnr.</b> BI803	<b>Utgåva</b> 06	<b>Sida 1 av 2</b>	
<b>Utfärdat av/Reviderad av</b>		<b>Godkänt av</b>		

## Förberedelser

Varje färdigspädd flaska med COVID-19 Vaccin Comirnaty innehåller vaccin till 6 doser.  
För varje flaska man ska iordningställa sex doseringssprutor från, behövs följande material:

Antal	Produkt
1	Pfizer COVID-19 Vaccin Comirnaty - färdigspädd
Minst 1	Injektionstork sprit 70% IPA, 30x30 mm
6	Injektionskanyler för im bruk
6	Sprutor ("low dead space" om tillgängligt), centrerad, 1 ml gradering 0,01ml, centrerad
6	Sprutetikett för COVID-19 Vaccin Comirnaty
1	Etikett till Zip-loc påse för COVID-19 Vaccin Comirnaty
1	Zip-Loc påse till sprutorna

*Tillämpa basala hygienrutiner och klädregler samt arbeta aseptiskt.*

## Färdigställande av administreringsprutor

- Rengör och desinfektera arbetsytan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.
- Kontrollera den spädda vaccinelösningen som ska var benvit till färgen och fri från partiklar. Om innehållet avviker ska produkten reklameras.
- Med aseptisk teknik, torka med injektionstork av gummimembranet på flaskan.  
*Observera att kanylens skyddshylsa ska återanvändas. Hantera så att aseptik bevaras vid brytande av kanylförpackningen.*
- Sätt injektionskanylen på en spruta och dra upp 0,3 ml av vaccinelösningen. För att undvika förlust av vaccinelösning, avlägsna luftbubblorna med nålen fortfarande i flaskan.
- Sätt tillbaka skyddshylsan på injektionskanylen.
- För varje ny dos, tag en ny spruta samt kanyl och upprepa steg 4 till 5 ovan. I det fall alla sprutor inte dras upp vid samma tillfälle börja på steg 1.
- Obs! Vaccin från flera injektionsflaskor ska inte blandas för att få ytterligare doser.**
- Ange hållbarhetsdatum, klockslag (*6 timmar från spädningstillfället, se information på vaccinflaska*) och signera på sprutetiketterna. Fäst därefter en etikett på respektive färdigställd spruta.
- Ange i lagerjournalen hur många sprutor som erhållits från de flaskor som förts ut för att beredas vid detta beredningstillfälle (för mer information, se "LF801 Covid-19 vaccin – Information till vaccinerande enheter").
- Där administrering och registrering sker i samma lokaler som iordningställande ska använd vaccinflaska skickas med på sprutfatet för att batchnumret ska vara tillgängligt vid registrering.
- I de fall administrering och registrering inte sker i samma lokaler som iordningställande ska de färdigställda sprutorna läggas i en Zip-loc påse. Fyll i de efterfrågade uppgifterna på etiketten avsedd för Zip-Loc påsen och fäst den på påsen. Lägg sprutorna i påsen.
- Förbrukade vaccinflaskor ska destrueras som riskavfall.

**ordningställande av  
administreringssprutor för Pfizer  
COVID-19 Vaccin Comirnaty**

**Dokumenttyp**  
Vägledande

**Dokumentnr.**  
BI803

**Utgåva**  
06

**Gäller fr.o.m**  
2021-02-04

**Sida 2 av 2**

Hantera därefter administreringssprutorna efter lokal rutin på enheten.

Historik

Dokument id	Ersätter dokument id	Ändringar/Revisionsorsak
BI803-03	BI802	Tillägg av texten: "Förbrukade vaccinflaskor ska destrueras som riskavfall" samt "tänk på att dra upp tillräckligt med volym för att kunna fylla injektionskanylen innan injektion".
BI803-04	BI803-03	Tagit bort användningen av uppdragskanyl. Uppdrag ska i stället ske med injektionskanylen. Tillägg om kontroll av vaccinlösning inför uppdrag samt information om vaccinflaska på sprutfat.
BI803-05	BI803-04	Förtydligande att man inte får blanda vaccin från olika flaskor i en spruta.
BI803-06	BI803-05	Tagit bort specificeringen av sprutor och kanyler då de kan komma att variera. Lagt till information om att dokumentera antalet uppdragna sprutor i lagerjournalen.