


Region Skåne Område Läkemedel Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret				
Spädningsinstruktion för Pfizer COVID-19 Vaccin Comirnaty	Dokumenttyp Vägledande		Gäller fr.o.m 2022-01-03	
	Dokumentnr. BI802	Utgåva 07	Sida 1 av 2	
Utfärdat av/Reviderad av		Godkänt av		

Förberedelser

Då hållbarhetstiden efter spädning är begränsad till 6 timmar är det viktigt att man i förväg har beräknat vilket antal flaskor man ska späda. Hur många doser (6 eller 7) man erhåller per varje färdigspädd flaska med Pfizer COVID-19 Vaccin Comirnaty varierar beroende på vilket material man använder sig av när man ska dra upp vaccinet i administreringsprutor. Se ”BI803 Iordningställande av administreringsprutor för Pfizer COVID-19 vaccin Comirnaty” för mer information.

Till varje flaska man ska späda behövs följande material:

Antal	Produkt
1	Pfizer COVID-19 Vaccin Comirnaty, 30 µg/dos (lila lock på flaskan)
1	Injektionstork sprit 70% IPA, 30x30 mm
1	Natriumklorid Fresenius Kabi, spädningsvätska för parenteral användning 9 mg/ml, 10 ml ampull
1	Spruta 2ml, 3 ml eller 5 ml, gradering 0,1 ml
1	Uppdragskanyl (i första hand 21G eller mindre)

Tillämpa basala hygienrutiner och klädregler samt arbeta aseptiskt.

Spädning

1. Tag fram det beräknade antalet flaskor som ska spädas ur kylan. Obs! Lila lock på flaskan.
2. För ur de framtagna flaskorna ur lagerjournal ”BL801 Lagerjournal Pfizer COVID-19 Vaccin Comirnaty”, fyll i: datum, antal flaskor, batch och signum (för förtydligande, se ”LF801 Covid-19 vaccin - information till vaccinerande enhet”).
3. Rengör och desinfektera arbetsytan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.
4. Vänd flaskan försiktigt upp och ned 10 gånger, *skaka inte!* Vätskan ska vara benvit till färgen och utan partiklar. Om den är missfärgad eller innehåller partiklar ska den reklameras.
5. Med aseptisk teknik, torka med injektionstork av gummimembranet på flaskan.
6. Drag upp **1,8 ml** natriumklorid 9 mg/ml, kassera natriumkloridampullen.
7. Tillsätt 1,8 ml Natriumklorid till flaskan och drag ut 1,8 ml luft ur flaskan in i den tomma sprutan för att neutralisera övertrycket innan du drar ut kanylen ur flaskan.
8. Vänd flaskan försiktigt upp och ned 10 gånger, *skaka inte!* Vätskan ska vara benvit till färgen och utan partiklar. Om den är missfärgad eller innehåller partiklar ska den kasseras.
9. Nytt utgångsdatum, klockslag och signum ska anges på avsedd plats på flaskan (*hållbarhet 6 timmar i rumstemperatur efter spädning*).



För uppdrag i administreringsprutor se instruktion ”BI803 Iordningställande av administreringsprutor för Pfizer COVID-19 vaccin Comirnaty”

**Spädningsinstruktion för Pfizer
COVID-19 Vaccin Comirnaty**

Dokumenttyp
Vägledande

Dokumentnr.
BI802

Utgåva
07

Gäller fr.o.m
2022-01-03

Sida 2 av 2

Historik

Dokument id	Ersätter dokument id	Ändringar/Revisionsorsak
BI802-03	BI802-02	Ändrat till att man kan erhålla 6 sprutor (i stället för 5).
BI802-04	BI802-03	Förtydligat i punkt 6 och 7 beträffande övertryck.
BI802-05	BI802-04	Tagit bort specificeringen av sprutor och kanyler i tabellen då de kan komma att variera. Ändrat i hur/vad som ska anges i lagerjournalen.
BI802-06	BI802-05	Förtydligat antalet doser man kan erhålla från en färdigspädd flaska (6 eller 7 doser, beroende på typ av administreringssprutor). Tagit bort separat lager för dos 1 och 2.
BI802-07	BI082-06	Borttag av information om att man i lagerjournalen efter uppdrag i doseringssprutor ska ange hur många sprutor man erhållit. Tillägg att produkten har lila lock på flaskan.