


Region Skåne Område Läkemedel Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret			
Spädningsinstruktion för Pfizer COVID-19 Vaccin Comirnaty - Barnformulering	Dokumenttyp Vägledande		Gäller fr.o.m 2022-01-03
	Dokumentnr. BI816	Utgåva 01	Sida 1 av 2
Utfärdat av/Reviderad av		Godkänt av	

Förberedelser

Då hållbarhetstiden efter spädning är begränsad till 12 timmar är det viktigt att man i förväg har beräknat vilket antal flaskor man ska späda. Se ”BI803 Iordningställande av administrerings sprutor för Pfizer COVID-19 vaccin Comirnaty” för mer information.


Till varje flaska man ska späda behövs följande material:

Antal	Produkt
1	Pfizer COVID-19 Vaccin Comirnaty, 10 µg/dos – Barnformulering (orangea lock på flaskan)
1	Injektionstork sprit 70% IPA, 30x30 mm
1	Natriumklorid Fresenius Kabi, spädningsvätska för parenteral användning 9 mg/ml, 10 ml ampull
1	Spruta 2ml, 3 ml eller 5 ml, gradering 0,1 ml
1	Uppdragskanyl (i första hand 21G eller mindre)

Tillämpa basala hygienrutiner och klädregler samt arbeta aseptiskt.

Spädning

1. Tag fram det beräknade antalet flaskor som ska spädas ur kylan. Obs! Orange lock på flaskan.
2. För ur de framtagna flaskorna ur lagerjournal ”BL819 Lagerjournal Pfizer COVID-19 Vaccin Comirnaty - Barnformulering”, fyll i: datum, antal flaskor, batch och signum (för förtydligande, se ”LF801 Covid-19 vaccin - information till vaccinerande enhet”).
3. Rengör och desinfektera arbetsytan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.
4. Vänd flaskan försiktigt upp och ned 10 gånger, *skaka inte!* Vätskan ska vara benvit till färgen och utan partiklar. Om den är missfärgad eller innehåller partiklar ska den reklameras.
5. Med aseptisk teknik, torka med injektionstork av gummimembranet på flaskan.
6. Drag upp **1,3** ml natriumklorid 9 mg/ml, kassera natriumkloridampullen.
7. Tillsätt 1,3 ml Natriumklorid till flaskan och drag ut 1,3 ml luft ur flaskan in i den tomma sprutan för att neutralisera övertrycket innan du drar ut kanylen ur flaskan.
8. Vänd flaskan försiktigt upp och ned 10 gånger, *skaka inte!* Vätskan ska vara benvit till färgen och utan partiklar. Om den är missfärgad eller innehåller partiklar ska den kasseras.
9. Nytt utgångsdatum, klockslag och signum ska anges på avsedd plats på flaskan (*hållbarhet 12 timmar i rumstemperatur efter spädning*).



För uppdrag i administrerings sprutor se instruktion ”BI815 Iordningställande av administrerings sprutor för Pfizer COVID-19 vaccin Comirnaty - Barnformulering”

Region Skåne Område Läkemedel Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret			
Spädningsinstruktion för Pfizer COVID-19 Vaccin Comirnaty	Dokumenttyp Vägledande		Gäller fr.o.m 2022-01-03 Sida 2 av 2
	Dokumentnr. BI816	Utgåva 01	

Historik

Dokument id	Ersätter dokument id	Ändringar/Revisionsorsak
BI815-01	Nytt dokument	Nytt dokument