

Koncernkontoret

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning
Regionala enheten för läkemedel

Dokumenttyp
Styrande

Gäller från och med
2023-11-29

Dokumentnummer
LF806

Versionsnummer
2

Utfärdad/reviderad av

Godkänd av



Covid- Vaccintyper och krav på förvaring och hantering – i dagsläget tillgängliga vaccin

Alla vaccinen är ljuskänsliga och ska förvaras i originalförpackningen tills användandet

Företag / produktnamn	Vaccintyp	Förpackning				Hållbarhet			Beredning	Dosering	Kommentarer	
		Formu- lering	Antal doser/ Flaska	Antal flaskor / Frp	Antal doser/ Frp	Varu- nummer	Förvarings- temperatur obruten flaska	Inför beredning	Efter beredning	Beredning		Dos
Pfizer/BioNTech / Comirnaty Omicron XBB.1.5	mRNA	Injväska, dispersion 30 µg/dos	6*	10	60	476238	-90 till -60 °C i 18 mån, 2-8 °C i 10 veckor	12 h före första punktion (8-30 °C) samt 12 h efter punktionen (2-30 °C)	Uppdraget i spruta: rumstemp 6 h	Nej	Till 12 år och äldre: 30 µg (0,3 ml)	Grått lock på flaskan
Pfizer/BioNTech (till barn 5-11 år) / Comirnaty Omicron XBB.1.5***	mRNA	Koncentrat till injväska, dispersion 10 µg/dos	6*	10**	10 flaskor: 60 doser 1 flaska: 6 doser	505762** 773888	-90 till -60 °C i 12 mån, 2-8 °C i 10 veckor	12 h före första punktion (8-30 °C) samt 12 h efter punktionen (2-30 °C)	Uppdraget i spruta: rumstemp 6 h	Nej	Till 5-11 år: 10 µg (0,3 ml)	Blått lock på flaskan
Pfizer/BioNTech (till barn 6 mån – 4 år) / Comirnaty Omicron XBB.1.5***	mRNA	Koncentrat till injväska, dispersion 3 µg/dos	10*	10**	10 flaskor: 100 doser 1 flaska: 10 doser	154149** 773889	-90 till -60 °C i 18 mån, 2-8 °C i 10 veckor	12 h före spädning (8-30 °C) samt 12 h efter spädning (2-30 °C)	Uppdraget i spruta: rumstemp 6 h	Rekonstitueras med NaCl 2,2 ml /flaska. NaCl ingår ej i förpackningen.	Till 6 mån – 4 år: 3 µg (0,2 ml)	Vinrött lock på flaskan.
Novavax / Nuvaxovid XBB.1.5	Rekombinant, adjuvanterat	injväska, dispersion	5	2	10	176819	2-8 grader i 9 månader	Bruten flaska: 2-25 grader i 6 h	Uppdraget i spruta: rumstemp 6 h	Nej	Till 31 år och äldre: 5 µg (0,5 ml)	

* Sprutor och/eller nålar med låg dödvoly (kombinationen ska ha en dödvoly på högst 35 µl) ska användas för att kunna extrahera angiven antal doser från en och samma injektionsflaska.

** Ej beställningsbart varunummer.

*** Ges endast på sjukhusen.