

Vägledning till vaccinatörer vid covid-19- vaccination, utifrån Folkhälsomyndighetens hälsodeklaration

1. Hälsodeklarationen granskas innan vaccinationen genomförs

Fråga 1

Om patienten har haft en snabb (inom 1 timma) eller en svår allergisk reaktion vid tidigare covid-19-vaccination, ska **remiss** skickas till specialistklinik för ställningstagande till vaccination.

Om patienten tidigare haft så svår reaktion att det krävts behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus efter annan vaccination eller annat injicerbart läkemedel, eller reagerat med upprepade anafylaxier mot läkemedel ska **remiss** skickas till specialistklinik

Se separat remissrutin. [hantering-av-vaccination-mot-covid-vid-allergi.pdf \(skane.se\)](https://www.skane.se/regionen/om-regionen/regionens-organisation/regionens-organisation-2022/hantering-av-vaccination-mot-covid-vid-allergi.pdf)

Fråga 2

Om patienten tidigare har haft en svår allergisk reaktion mot något av följande: födoämnen, insektsstick, latex, kontrastmedel, lokalanestetika eller läkemedel peroralt (t.ex. antibiotika), kan patienten vaccineras på vårdcentralen. Patienten ska stanna kvar och observeras i 30 minuter. Det ska förutom anafylaxiberedskap även finnas möjlighet för akutbehandling, såsom att ge syrgas och sätta dropp.

Om patienten tidigare reagerat med upprepade anafylaktiska reaktioner mot läkemedel eller har haft en så svår reaktion att det krävts behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus efter annan vaccination eller annat injicerbart läkemedel, ska **remiss** skickas till specialistklinik.

Om patienten tidigare haft en svår allergisk reaktion på PEG, polysorbat eller polyoxyl 35 ricinolja ska **remiss** skickas till specialistklinik

Om patienten har systemisk mastocytos ska **remiss** skickas till specialistklinik.

Se separat remissrutin. [hantering-av-vaccination-mot-covid-vid-allergi.pdf \(skane.se\)](https://www.skane.se/regionen/om-regionen/regionens-organisation/regionens-organisation-2022/hantering-av-vaccination-mot-covid-vid-allergi.pdf)

Fråga 3

Om patienten har blödarsjuka eller ökad blödningsbenägenhet: Rådgör med behandlande läkare. Grundsjukdom och aktuell situation avgör om vaccination kan genomföras.

Fråga 4

Vaccinerna är godkända att ges under hela graviditeten. För gravida utan annan underliggande sjukdom rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan. För gravida med annan underliggande sjukdom, där det är viktigt med ett tidigt skydd, kan vaccination påbörjas även i första trimestern.

För gravida som påbörjat en vaccinationsserie innan graviditet (alt. innan graviditet blev känd) rekommenderas att vaccinationsserien fullföljs som planerat, d.v.s. att dos 2 erbjuds med ordinarie intervall oavsett graviditetsvecka.

Fråga 5

Om personen är vaccinerad mot annan sjukdom ska det ha gått minst 7 dagar innan vaccinationen mot covid-19 kan ges

- 2. Vaccinationen ges intramuskulärt i överarmen (musculus deltoideus).**
[Beskrivning av korrekt tillvägagångssätt vid intramuskulär injektion.](#)
- 3. Alla vaccinerade ska, om inget annat anges enligt ovan, stanna kvar och observeras 15 minuter efter vaccinationen.**
- 4. Anafylaxiberedskap**
Anafylaxiberedskap ska finnas enligt gängse rutiner överallt där vaccinerna ges.
- 5. Ge inte antihistamin profylaktiskt**
Detta kan maskera tidiga hudreaktioner innan en anafylaxi utvecklas. Patienter med känd/diagnosticerad urtikariaproblematik och daglig medicinering med antihistaminer bör inte göra uppehåll med denna medicin och när de ska vaccineras.

All information från hälsodeklarationen ska föras in i PMO enligt registreringsanvisningen för Covidvaccinationer. När all information är införd och signerad i PMO kan hälsodeklarationen makuleras. Om inte all information förs in i PMO ska hälsodeklarationen bevaras genom att scannas.

Kompletterade information och referenser finns på Vårdgivare Skåne:

[Vaccination mot covid-19 - för vårdgivare - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)