

Rutiner vid fynd av respektive screeningodling avseende resistent bakterier och *Serratia marcescens* på neonatalavdelning

Screeningodling en gång per vecka

Alla inneliggande barn screeningodlas en gång per vecka på en bestämd veckodag. Respektive enhet väljer vilken veckodag som passar i samråd med Klinisk mikrobiologi.

Barnet provtas från svalg (MRSA, *Serratia marcescens*) och rektum/faeces (ESBL, *Serratia marcescens*) perineum (MRSA).

Åtgärder vid fynd av ett nytt fall av resistent bakterie eller *Serratia marcescens*

- Aktuell patient isoleringsvårdas. Barnets föräldrar och syskon ska enbart vistas på barnets rum och får inte vistas i allmänna utrymmen på vårdavdelningen.
- Eventuella medpatienter i samma rum räknas som exponerade och isoleringsvårdas på eget rum. Dessa barn följs upp med extra screening för aktuell bakterie vid tre tillfällen under en veckas tid (förslagsvis torsdag, måndag, torsdag). Om dessa odlingar är negativa hävs isoleringsvården. Barnets/barnens föräldrar och syskon ska enbart vistas på barnets rum och får inte vistas i allmänna utrymmen på vårdavdelningen till dess att isoleringsvården är hävd.

Åtgärder vid fynd av två eller flera fall av resistent bakterie eller *Serratia marcescens*

- Exponerade patienter isoleringsvårdas på eget rum. Dessa barn följs upp med extra screening för aktuell bakterie vid tre tillfällen under en veckas tid (förslagsvis torsdag, måndag, torsdag). Om dessa odlingar är negativa hävs isoleringsvården. Barnens föräldrar och syskon ska enbart vistas på barnets rum och får inte vistas i allmänna utrymmen på vårdavdelningen till dess att isoleringsvården är hävd.
- Samtliga barn på vårdavdelningen screeningodlas för aktuell bakterie vid upptäckten.
- Screeningodling av samtliga barn på vårdavdelningen pågår två gånger per vecka tills dess att smittspridningen anses vara under kontroll. Bedömning görs av ansvarig på neonatalavdelningen i samråd med Vårdhygien.

Vid misstanke om okontrollerad spridning av resistent bakterie eller *Serratia marcescens*

- Screeningodling av samtliga barn på vårdavdelningen pågår två gånger per vecka till dess att smittspridningen anses vara under kontroll. Bedömning görs av ansvarig på neonatalavdelningen i samråd med Vårdhygien.
- Beslut om behov av intagningsstopp görs av ansvarig på neonatalavdelningen i samråd med Vårdhygien.

Neonatalavdelning

Faktaägare: Vårdhygien Skåne
Godkänt av: Anna Holmberg

Datum: 2021-02-22
Ersätter: 2017-10-17

Sida: 2 (2)

Provtagning av familjemedlemmar

- Rutinmässig provtagning av familjemedlemmar vid *ett* nytt fall:
 - MRSA: Samtliga familjemedlemmar provtas
 - ESBL: mamman provtas
 - *Serratia marcescens*: inga familjemedlemmar provtas

För övriga vårdrutiner och specialåtgärder vid misstänkt eller känt bärarskap av resistenta bakterier – se respektive dokument under ”resistenta bakterier” under ”regionala riktlinjer och rutiner” på Vårdhygiens hemsida www.skane.se/vardhygien.

Rutiner vid fynd av respektive screeningodling avseende resistenta bakterier och *Serratia marcescens* på neonatalavdelning

Vårdhygien Skåne

<http://www.skane.se/vardhygien>

Utskrivna kopior gäller inte som original

