

## حماية طفلك من فيروس RS (فيروس الجهاز التنفسي المخلوي)



## الخلفية

يتعرض حديثو الولادة والرضع الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر خلال موسم فيروس RS لخطر الإصابة بعدوى فيروس RS الحادة التي تتطلب عناية طبية. في موسم 2026/2025، سيتم تقديم العلاج الوقائي باستخدام عقار بيوفورتوس® لجميع الأطفال حديثي الولادة اعتباراً من 2025-09-10.

### ما هو عقار بيوفورتوس®؟

إن بيوفورتوس ليس لقاحاً بل هو دواء يحتوي على مادة نيرسيفيماب. فهو أجسام مضادة "جاهزة" تقلل من خطر الإصابة بعدوى فيروس RS الحادة عن طريق منع فيروس RS من الالتصاق بالأغشية المخاطية للطفل. يُعطى بيوفورتوس على شكل حقنة في العضل. من المتوقع أن يظهر تأثير عقار بيوفورتوس خلال فترة أقصاها أسبوع بعد الحقن، ويستمر لمدة 5-6 أشهر على الأقل. ينشط العقار خلال الموسم المعني، ولكنه لا يوفر حماية طويلة الأمد.

تصل الحماية إلى أقصى درجة عندما تكون العدوى شديدة وتتطلب دخول المستشفى و/أو دعم الجهاز التنفسي، وتحقق حينها تأثيراً وقائياً بنسبة 70-80% تقريباً.

من هم الأطفال الذين يجب أن يحصلوا على بيفورتوس؟

سيتم تقديم لقاح بيفورتوس لجميع الأطفال حديثي الولادة اعتباراً من 10-09-2025 إلى أن تعلن وكالة الصحة العامة في السويد عن انتهاء موسم 2025/2026 لفيروس RS.

عطاء طفلك بيفورتوس، فمن المهم اتباع النصائح  
ة طفلك حديث الولادة من العدوى، بما في ذلك  
إن هذه النصائح متاحة عبر رمز الاستجابة



### الآثار الجانبية؟

تم استخدام بيفورتوس في بلدان أخرى على ما مجموعه 6.9 مليون طفل دون حدوث آثار جانبية خطيرة. أصيب أقل من طفل واحد من كل مائة بطفح جلدي أو حمى. هناك أيضاً أوصاف قليلة تتحدث عن ردود فعل فرط الحساسية، ولكنها لم تكن شديدة.

إذا كنت تشك في إصابة طفلك بآثار جانبي، فيجب عليك الاتصال بأخصائي الرعاية الصحية. إذا أصيب الطفل الذي يقل عمره عن ثلاثة أشهر بالحمى، فيجب الاتصال دائماً بأخصائي الرعاية الصحية. من المرجح أن يكون الطفل مصاباً بعدوى تتطلب علاجاً أكثر من احتمال إصابته بأحد الآثار الجانبية للبيفورتس.

## ماذا لو تم تطعيم الأم بـلقاح أبريسوفو® المضاد لفيروس RS؟

بالنسبة للأطفال الذين سيُخرجون من مستشفى الولادة، إذا تم تطعيم الأم بـلقاح أبريسوفو قبل 14 يوماً على الأقل من الولادة، فإن الطفل حديث الولادة يكون قد حصل على حماية مكافئة لتلك التي توفرها الإجراءات الوقائية. في هذه الحالة، لا يُحسّن بيوفورتوس حماية الطفل.

### متى يجب إعطاء الحقنة؟

إن العلاج الوقائي من فيروس RS اختياري ومجاني ويتطلب موافقة شفوية من ولي الأمر.

يتم إعطاء بيوفورتوس عادةً بعد فحص الطفل، وقبل الخروج من المستشفى. بعد الأسبوع الأول من عمر الطفل، أي عندما تنتقل المسؤولية عن الطفل إلى عيادة طب الأطفال، لا يمكن تقديم العلاج الوقائي لفيروس RS للطفل بعد ذلك. بالنسبة لموسم 2025/2026، يتم تقديم بيوفورتوس فقط في أقسام التوليد وحديثي الولادة وأقسام الرعاية المتخصصة للأطفال، أي ليس عن طريق عيادة طب الأطفال أو الرعاية الأولية.

