

حماية طفلك من فيروس RS (فيروس الجهاز التنفسي المخلوي)

الأطفال المعرضون لخطر متزايد للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي
المخلوي الحاد RS



الخلفية

يتعرض حديثو الولادة والرضع الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر خلال موسم فيروس RS لخطر كبير للإصابة بعدوى فيروس RS الحادة والتي تتطلب عناية طبية. في موسم 2025/2026، سيتم تقديم العلاج الوقائي باستخدام عقار بيوفورتوس® لجميع الأطفال حديثي الولادة اعتباراً من 10-09-2025. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم بيوفورتوس لبعض الأطفال الأكبر سناً المعرضين لخطر الإصابة بعدوى فيروس RSV الحاد.

ما هو عقار بيوفورتوس®؟

إن بيوفورتوس ليس لقاحاً بل هو دواء يحتوي على مادة نيرسيفيماب. فهو أجسام مضادة "جاهزة" تقلل من خطر الإصابة بعدوى فيروس RS الحادة عن طريق منع فيروس RS من الالتصاق بالأغشية المخاطية للطفل. يُعطى بيوفورتوس على شكل حقنة في العضل. من المتوقع أن يظهر تأثير عقار بيوفورتوس خلال فترة أقصاها أسبوع بعد الحقن، ويستمر لمدة 5-6 أشهر على الأقل. ينشط العقار خلال الموسم المعني، ولكنه لا يوفر حماية طويلة الأمد.

تصل الحماية إلى أقصى درجة عندما تكون العدوى شديدة وتتطلب دخول المستشفى و/أو دعم الجهاز التنفسي، وتحقق حينها تأثيراً وقائياً بنسبة 70-80% تقريباً.

من هم الأطفال الذين يجب أن يحصلوا على بيفورتوس؟

سيتم تقديم لقاح بيفورتوس لجميع الأطفال حديثي الولادة اعتباراً من 2025-09-10 إلى أن تعلن وكالة الصحة العامة في السويد عن انتهاء موسم 2026/2025 لفيروس RS.

يتم تقديم العلاج الوقائي لفيروس RS للأطفال الذين ينتمون إلى المجموعات عالية الخطورة للإصابة بعدوى فيروس RS الحادة إذا كان عمرهم أقل من 12 شهراً عند بداية موسم فيروس RS. وينطبق هذا، على سبيل المثال، على الأطفال المولودين مبكراً قبل الأسبوع الثاني والثلاثين من الحمل أو الأطفال الذين ينتمون إلى أي مجموعة أخرى عالية الخطورة والتي حددها وكالة الصحة العامة في السويد.

عطاء طفلك بيفورتوس، فمن المهم اتباع النصائح
ة طفلك حديث الولادة من العدوى، بما في ذلك
. إن هذه النصائح متاحة عبر رمز الاستجابة



الآثار الجانبية؟

تم استخدام بيفورتوس في بلدان أخرى على ما مجموعه 6.9 مليون طفل دون حدوث آثار جانبية خطيرة. أصيب أقل من طفل واحد من كل مائة بطفح جلدي أو حمى. هناك أيضاً أوصاف قليلة تتحدث عن ردود فعل فرط الحساسية، ولكنها لم تكن شديدة.

إذا كنت تشك في إصابة طفلك بآثار جانبي، فيجب عليك الاتصال بأخصائي الرعاية الصحية. إذا أصيب الطفل الذي يقل عمره عن ثلاثة أشهر بالحمى، فيجب الاتصال دائماً بأخصائي الرعاية الصحية. من المرجح أن يكون الطفل

مصائباً بعدوى تتطلب علاجاً أكثر من احتمال إصابته بأحد الآثار الجانبية للبيفورتس.

ماذا لو تم تطعيم الأم بلقاح أبريسوفو® المضاد لفيروس RS؟

حتى لو تم تطعيم الأم بلقاح أبريسوفو، يجب إعطاء لقاح بيفورتس للأطفال المنتمين لمجموعة المخاطر الكبيرة والمولودين قبل 10-09-2025.

متى يجب إعطاء الحقنة؟

إن العلاج الوقائي من فيروس RS اختياري ومجاني ويتطلب موافقة شفوية من ولي الأمر.

يتم تقديم بيفورتس للأطفال المنتمين لمجموعة المخاطر الكبيرة من خلال خدمات طب الأطفال المتخصصة.

بالنسبة لموسم 2025/2026، يتم تقديم بيفورتس فقط في أقسام التوليد وحديثي الولادة وأقسام الرعاية المتخصصة للأطفال، أي ليس عن طريق عيادة طب الأطفال أو الرعاية الأولية.

