

Vad gäller om mamman har vaccinerats med Abrysvo® mot RS-virus?

För barn som går hem från BB gäller att om mamman under den aktuella graviditeten har blivit vaccinerad med Abrysvo minst 14 dagar innan förlossningen har det nyfödda barnet fått ett likvärdigt skydd som profylaxen ger. I det läget förbättrar Beyfortus inte barnets skydd.

När ska injektionen ges?

RSV-profylax är frivillig, kostnadsfri och kräver muntligt samtycke från vårdnadshavare.

Beyfortus ges vanligen efter barnläkarundersökningen, innan hemgång från BB. Efter första levnadsveckan, när ansvaret för barnet har gått över till BVC, kan RS-virusprofylax inte längre erbjudas till barnet. För säsongen 2025/2026 erbjuds Beyfortus endast inom förlossnings-, BB-, neonatal- och specialiserad barnsjukvård, alltså inte via BVC eller primärvård.

Skydda ditt barn mot RS-virus



Bakgrund

Nyfödda och spädbarn som under RS-virussäsong är yngre än 3 månader gamla har hög risk för att insjukna i svår sjukvårdskrävande RS-virusinfektion. Säsongen 2025/2026 erbjuds förebyggande behandling med Beyfortus® till alla nyfödda barn from 2025-09-10.

Vad är Beyfortus®?

Beyfortus är inte ett vaccin utan ett läkemedel som innehåller ämnet nirsevimab. Det är ”färdiga” antikroppar som minskar risken för svår RSV-infektion genom att hindra RS-virus från att fästa vid barnets slemhinnor. Beyfortus ges som en spruta i låret. Beyfortus bedöms ha effekt senast inom en vecka efter injektionen och varar i minst 5 – 6 månader. Det är verksamt under aktuell säsong men lämnar inte något långvarigt skydd.

Skyddet är starkast mot svår infektion som kräver sjukhusvård och/eller andningsstöd och uppnår där en skyddseffekt på cirka 70 – 80%.

Vilka barn ska erbjudas Beyfortus?

Alla nyfödda barn erbjuds Beyfortus från och med 2025-09-10 fram till Folkhälsomyndigheten förklarar RS-virussäsongen 2025/2026 avslutad.

Även om ditt barn har fått Beyfortus är det viktigt att följa de allmänna råden för att skydda ditt nyfödda barn mot infektioner, inklusive RS-virus. Dessa finns via QR-koden.



Biverkningar?

Beyfortus har i andra länder använts till totalt 6,9 miljoner barn utan att allvarliga biverkningar inträffat. Mindre än ett barn av hundra har utvecklat utslag eller feber. Det finns även enstaka beskrivningar av överkänslighetsreaktioner, som dock inte har varit allvarliga.

Misstänker du att ditt barn drabbats av en biverkan ska du kontakta sjukvården. Om ett barn som är yngre än tre månader får feber ska man alltid kontakta sjukvården. Det är mer troligt att barnet har drabbats av en infektion som kräver behandling än att det är en biverkan av Beyfortus.