

Misstänker du att ditt barn drabbats av en biverkan ska du kontakta sjukvården. Om ett barn som är yngre än tre månader får feber ska man alltid kontakta sjukvården. Det är mer troligt att barnet har drabbats av en infektion som kräver behandling än att det är en biverkan av Beyfortus.

Vad gäller om mamman har vaccinerats med Abrysvo® mot RS-virus?

Även om mamman har vaccinerats med Abrysvo ska barn som tillhör högriskgruppen och som är födda före 2025-09-10 erbjudas Beyfortus.

När ska injektionen ges?

RSV-profylax är frivillig, kostnadsfri och kräver muntligt samtycke från vårdnadshavare.

Barn tillhörande högriskgrupp erbjuds Beyfortus via den specialiserade barnsjukvården.

För säsongen 2025/2026 erbjuds Beyfortus endast inom förlossnings-, BB-, neonatal- och specialiserad barnsjukvård, alltså inte via BVC eller primärvård.

Skydda ditt barn mot RS-virus

Barn med ökad risk för svår RS-virusinfektion



Bakgrund

Nyfödda och spädbarn som under RS-virussäsong är yngre än 3 månader gamla har hög risk för att insjukna i svår sjukvårdskrävande RS-virusinfektion. Säsongen 2025/2026 erbjuds förebyggande behandling med Beyfortus® till alla nyfödda barn från 2025-09-10. Dessutom erbjuds Beyfortus till vissa äldre barn med ökad risk att insjukna i svår RS-virusinfektion.

Vad är Beyfortus®?

Beyfortus är inte ett vaccin utan ett läkemedel som innehåller ämnet nirsevimab. Det är ”färdiga” antikroppar som minskar risken för svår RSV-infektion genom att hindra RS-virus från att fästa vid barnets slemhinnor. Beyfortus ges som en spruta i låret. Beyfortus bedöms ha effekt senast inom en vecka efter injektionen och varar i minst 5 – 6 månader. Det är verksamt under aktuell säsong men lämnar inte något långvarigt skydd.

Skyddet är starkast mot svår infektion som kräver sjukhusvård och/eller andningsstöd och uppnår där en skyddseffekt på cirka 70 – 80%.

Vilka barn ska erbjudas Beyfortus?

Alla nyfödda barn erbjuds Beyfortus från och med 2025-09-10 fram till Folkhälsomyndigheten förklarar RS-virussäsongen 2025/2026 avslutad.

Barn som tillhör högriskgrupperna för allvarlig RS-virusinfektion erbjuds RS-virusprofylax om de är yngre än 12 månader vid start av RS-virussäsongen. Detta gäller t ex prematurfödda barn före graviditetsvecka 32 eller barn som tillhör någon annan högriskgrupp definierad av Folkhälsomyndigheten.

Även om ditt barn har fått Beyfortus är det viktigt att följa de allmänna råden för att skydda ditt nyfödda barn mot infektioner, inklusive RS-virus. Dessa finns via QR-koden.



Biverkningar?

Beyfortus har i andra länder använts till totalt 6,9 miljoner barn utan att allvarliga biverkningar inträffat. Mindre än ett barn av hundra har utvecklat utslag eller feber. Det finns även enstaka beskrivningar av överkänslighetsreaktioner, som dock inte har varit allvarliga.