

دستور العمل برای مریضان

معاینه ادرار – لوله آزمایشی با سورنج

شما این را ضرورت دارید


لیوان یک بار مصرف پلاستیکی. لوله و ظرف مخصوص نمونه برداری که از داکتر معالج خود گرفته اید.

اینطور انجام دهید:




نباید 4 ساعت پیش از گرفتن معاینه ادرار کرده باشید.


هنگام گرفتن معاینه:
زنان: لبچه های قسمت خارجی آلت تناسلی را از هم دور نگهدارید.
 اگر خون ریزی و یا ترشح دارید، یک تامپون را در مجرای آلت تناسلی تان پیش از معاینه بگذارید.
مردان: پوست ختنه گاه را عقب بکشید.




- (1) اول کمی در توالت ادرار کنید.
- (2) تست گیر را داخل گرفته و تا نصف در آن ادرار کنید.
- (3) باقی مانده ادرار تان را در توالت کنید.




نی سوزنی را داخل لیوان حاوی ادرار قرار دهید. سپس لوله ی آزمایش را به همراه کلاهک اش داخل فضای خالی نی سوزنی قرار داده و فشار دهید. لوله آزمایش از ادرار پُر می شود. لوله را همانطور نگه می دارید تا زمانی که دیگر پر نشود.



لوله آزمایش را با نوشتن، نام، نمره شناسایی، تاریخ گرفتن معاینه و ساعت اخذ آن نشانی کنید. برچسپ که از داکتر معالج خود دریافت کردید استفاده کنید. برچسپ را از سمت بالا به پایین در لوله بچسبانید.




لوله آزمایش را در یخچال و یا پلاستیک با یخ نگهدارید.



4-8°C

لوله آزمایش را همان روز که شما آنرا برای معاینه پُر نموده اید به معالج خود بسپارید.
 لوله آزمایش را در یک پلاستیک که دارای یخ باشد انتقال دهید.
 کارت شناسایی با اعتبار تان را با خود داشته باشید.



4-8°C

