Koncernkontoret
Läkemedelsrådet

PATIENTINFORMATION

Process	3.3.9
Skapad av	LAG läkemedel endokrina sjukdomar
Godkänd av	Läkemedelsrådet
Gäller för	Utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne

Version	3
Dokument id	L4EN4-03
Godkänt datum	2026-11-17
Gäller t.o.m.	2028-11-17

Information till dig som använder SGLT2-hämmare: .....

SGLT2-hämmare är effektiva läkemedel vid typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom, hjärtsvikt och njursvikt.

Vid lågt kolhydratintag, uttorkning eller hög alkoholkonsumtion finns risk för en **sällsynt** men **allvarlig** biverkan, så kallad diabetisk ketoacidos, vilket innebär en ökad halt av syror i blodet med normalt eller bara lätt förhöjt blodsocker.

I följande risksituationer ska du göra uppehåll i behandlingen och kontakta förskrivande vårdenhet (eller 1177):

- Magsjuka (kräkning/diarré)
- Infektion med hög feber och svårighet att få i sig vätska
- Akut allvarlig sjukdom
- Fasta

Inför större operationer **kontakta opererande enhet**

Vid följande symtom på ketoacidos ska du omedelbart kontakta vården (och tydligt informera om att du använder SGLT2-hämmare):

- Illamående, magont och kräkningar
- Ovanlig trötthet eller sänkt medvetande
- Andfåddhet
- Sötaktig/acetondoftande andedräkt
- Kraftigt ökad törst