Koncernkontoret
Läkemedelsrådet

PATIENTINFORMATION

Process	3.3.9
Skapad av	LAG läkemedel endokrina sjukdomar
Godkänd av	Läkemedelsrådet
Gäller för	Utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne

Version	2
Dokument id	L4EN5-02
Godkänt datum	2026-11-17
Gäller t.o.m.	2028-11-17

Information till dig som använder läkemedel som innehåller metformin

Metformin är förstahandsbehandling vid typ 2 diabetes och har en god blodsockersänkande effekt.

Vid **vätskebrist** finns risk för en allvarlig biverkan (mjölksyraförgiftning) av metformin. Risken ökar vid hög ålder eller nedsatt njurfunktion.

I följande risksituationer för vätskebrist ska du tillfälligt pausa behandlingen:

- Ökade vätskeförluster, exempelvis vid kräkningar och diarréer, feber.
- Bristande vätskeintag det vill säga att du av någon anledning dricker för lite.

Vid tveksamhet kontakta din vårdcentral/diabetesmottagning eller 1177.

Ibland behöver metformin-behandlingen även tillfälligt pausas vid röntgenundersökningar med kontrastmedel. Kontakta röntgenundersökande enhet för besked.