

Ultraljudsundersökning och vävnadsprov från prostatakörteln

Bra att känna till inför ditt besök

Om du tar något blodförtunnande läkemedel behöver du höra av dig till oss en vecka innan ditt besök. Inför vävnadsprovtagning är det viktigt att du tillfälligt gör uppehåll med läkemedlet för att minska risken för blödning.

Om du planerar en resa som innefattar flyg, en längre båtresa eller någon annan resa där man inte enkelt kan få kontakt med sjukvård, uppmanar vi dig att höra av dig till oss innan ditt besök för att omboka din tid, såvida du inte ändrar dina planer. Använd dig av bifogat telefonnummer.

Du får gärna ta med dig en närstående vid ditt mottagningsbesök.

Ultraljud och vävnadsprover (biopsier)

För att utreda orsaken till att ditt PSA är förhöjt gör läkaren en ultraljundsundersökning av prostatakörteln. Det innebär att läkaren för in ett stavformat instrument några centimeter i ändtarmen och får en bild av prostatan på en bildskärm.

Oftast kompletteras undersökningen med vävnadsprover. Vi tar proverna med en tunn nål genom ultraljundsstaven.

Prostatakörteln bedövas innan vi tar proverna. Provtagningen tar ett par minuter och känns vanligen ungefär som ett stick för

blodprov. Vi analyserar proverna i mikroskop, och det tar ett par veckor innan du får resultatet av provtagningen.

Magnetkameraundersökning (MR) av prostata

Om du gjort MR av prostata får du svar på undersökningen i samband med läkarbesöket på urologimottagningen

Biverkningar efter vävnadsprovtagning

Efter undersökningen är det vanligt att få blod i urinen, avföringen och sädesvätskan. Det är sällan allvarligt. Om du blöder från tarmen brukar det upphöra på ett par dagar. Blod i urinen försvinner inom ett par veckor, och blod i sädesvätskan kan förekomma under någon månad. Drick extra mycket de första dagarna efter undersökningen för att skölja igenom urinblåsan.

Det finns också en lite risk för infektion efter vävnadsprovtagningen. Om du får feber de närmaste dagarna efter provtagningen ska du uppsöka akutmottagning.

Biobankslagen

Om man tar vävnadsprov från prostata sparas provet i en Biobank. Om du inte vill att provet sparas måste du meddela detta vid ditt mottagningsbesök. För mer information, kontakta din behandlande läkare.