

## ข้อมูลสำหรับผู้ที่มีโลหิตกลุ่มอาร์เอชลบ และกำลังตั้งครรภ์บุตรที่มีโลหิตกลุ่มอาร์เอช บวก

การวิเคราะห์โลหิตของคุณตอนที่มาลงทะเบียนเพื่อฝากครรภ์ที่แผนกผดุงครรภ์ ได้แสดงผลออกมาว่าคุณมีโลหิตกลุ่มอาร์เอชลบ และกำลังตั้งครรภ์บุตรที่มีโลหิตกลุ่มอาร์เอชบวก ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงเล็กน้อยที่คุณจะสร้างแอนติบอดีต่อเม็ดโลหิตแดงของเด็ก ซึ่งเรียกว่าการสร้างภูมิต้านทานต่อสารดี (D) ในระหว่างการตั้งครรภ์ได้ ซึ่งสิ่งนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในระยะสามเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของสวีเดนและต่างประเทศได้แสดงให้เห็นว่าสามารถลดความเสี่ยงนี้ให้น้อยลงได้เป็นอย่างมาก โดยการให้ยาฉีดแอนติดีเพื่อเป็นการป้องกันเพิ่มเติมเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น

ด้วยเหตุนี้คุณจึงได้รับเชิญให้มารับการรักษาเพื่อการป้องกันนี้ในตอนนี้ การฉีดยาจะฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อ และการรักษานั้นไม่มีความเสี่ยงใดทั้งสำหรับคุณและบุตรที่อยู่ในครรภ์ สตรีมีครรภ์ที่มีโลหิตหมู่อาร์เอชลบในภูมิภาคสโกเน่ที่กำลังตั้งครรภ์บุตรที่มีโลหิตกลุ่มอาร์เอชบวก ได้รับเชิญให้มารับการรักษาเพื่อการป้องกันนี้ทุกคน

ผดุงครรภ์ของคุณจะทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจในช่วงการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 24-25 ก่อนที่คุณจะสามารถรับยาฉีดได้

การฉีดยาจะฉีดให้ในช่วงการตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 28-30 ที่แผนกผดุงครรภ์ของคุณ

คุณจะได้รับยาฉีดแอนติดีอีกหนึ่งเข็มหลังการคลอดบุตรด้วย