

Om du vaccinerade dig mot RS-virus under graviditeten

Vaccinerade du dig minst två veckor före förlossningen? I så fall behöver barnet inte få behandlingen.

Dina antikroppar skyddar barnet mot RS-virus tills barnet blir sex månader.

Minska risken för att barnet smittas

Du kan minska risken för att barnet smittas av RS-viruset och andra virus. Följ de här råden:

- Tvätta händerna ofta.
- Använd handsprit om inte tvål och vatten finns.
- Träffa gärna andra personer utomhus.
- Undvik att träffa personer som är förkylda.
- Håll avstånd till andra människor, särskilt inomhus.

Läs mer om RS-virus och hur du skyddar ditt barn:



Använd QR-koden eller sök på "RS-virus" på 1177.se



Använd QR-koden eller sök på "Skydda spädbarn mot RS-virus" på folkhalsomyndigheten.se

Behandling som skyddar mot RS-virus



RS-virus hos barn

RS-viruset är vanligt. De flesta barn blir sjuka som vid en förkylning.

Men vissa barn kan bli mycket sjuka av RS-virus. Till exempel barn som är yngre än 6 månader.

Därför erbjuds förebyggande behandling mot RS-virus till nyfödda barn och barn som har en ökad risk att bli mycket sjuka.

Behandling mot RS-virus

Behandlingen ges under den tid på året när RS-virus sprids som mest. Det är oftast under hösten, vintern och våren.

Behandlingen är ett läkemedel med antikroppar. Så här fungerar det:

- Antikroppar skyddar mot virus.
- Barnet får färdiga antikroppar mot RS-virus genom behandlingen.
- Antikroppar ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom.

Du som är vårdnadshavare behöver säga ja till att barnet ska få behandlingen. Behandlingen är gratis.

När får barnet behandlingen?

Behandlingen ges på sjukhuset.

Nyfödda barn erbjuds behandling efter förlossningen eller under ett återbesök på sjukhuset.

Behandlingen ges inom sju dagar efter förlossningen.

Så går behandlingen till

Barnet får en spruta med antikroppar i ena låret. Behandlingen skyddar barnet mot RS-virus i fem till sex månader.

Så mår barnet efteråt

De flesta barn mår bra efter behandlingen. Huden kan bli lite öm och röd där barnet fick sprutan. En del barn har fått utslag eller feber.

Biverkningar är mycket ovanliga. Behandlingen är noga testad. Kontakta alltid sjukvården om ditt barn är yngre än tre månader och får feber.

Kan behandling mot RS-virus påverka vaccin som mitt barn ska få?

Nej, behandlingen påverkar inte vaccin.