

Barn med urinvägsinfektion utan feber

Råd och fakta till vårdnadshavare

Urinvägsinfektion utan feber (akut cystit) kan vara mycket besvärande. Infektionen orsakas av bakterier i urinrör och urinblåsa.

Symtom

- Barnet behöver kissa ofta.
- Det svider när barnet kissar.
- Barnet har svårt att hålla tätt. Vissa barn som tidigare varit torra på natten kan börja kissa i sängen.
- Barnet har ont i magen.

Symtomen brukar vara mindre tydliga ju yngre barnet är. Därför kan urinvägsinfektion vara svår att upptäcka hos barn som är yngre än två år.

Ibland beror besvären inte på urinvägsinfektion utan på något annat. Det kan till exempel vara en irritation i urinröret eller en annan typ av infektion i underlivet.

Sök alltid vård om ditt barn har tecken på urinvägsinfektion.

Barn under 2 år med urinvägsinfektion samt barn äldre än 2 år med allmänpåverkan och urinvägsinfektion tas om hand på barnakutmottagning.

Provtagning

Barnet får lämna ett urinprov. Även små barn med blöja kan lämna ett urinprov.

Tips när små barn ska lämna urinprov

- Börja med att tvätta barnets underliv.
- Torka genom att klappa med en handduk.
- Sitt sedan med barnet utan blöja i knät och var beredd att fånga upp urinen i en provtagningsburk eller skål när barnet kissar.
- Du kan prova att ge barnet extra dryck eller spola kranvatten som ger ett ljud som gör att barnet vill kissa.

Urinprovet kontrolleras ofta med urinsticka direkt men behöver även skickas för urinodling för att säkerställa om det finns bakterier i urinen.

Ibland kontrolleras barnets temperatur och vissa barn får lämna blodprov.

Antibiotikabehandling

Förstahandsbehandling för barn 2 år eller äldre är nitrofurantoin i fem dagar. Barn 5 år eller äldre behandlas i första hand med pivmecillinam i fem dagar. Andra sorters antibiotika som ibland används är cefadroxil eller trimetoprim.

Att vara uppmärksam på

Kontakta vården på nytt om barnet försämras eller inte blivit bättre på en vecka. Det är viktigt att söka vård omgående om barnet får feber (temperatur över 38 grader) eller verkar påverkat till allmäntillståndet.

Barn som får urinvägsinfektioner flera gånger ska utredas vidare.