

Denna sida fylls i av BVC

Spädbarn med ikterus efter 2–3 veckors ålder, remissmall för BVC

Spädbarn som är gula i huden vid två, ej senare än tre, veckors ålder ska utredas för att utesluta ovanliga, sjukliga orsaker till gulheten. Om barnet på BVC bedöms som välmående och uppfyller vissa kriterier kan det räcka med blodprovstagning. Blodprovet tas på barn- och ungdomsakuten (BAKM). Om barnet på BVC däremot inte verkar må bra eller uppfyller andra kriterier behövs brådskande läkarundersökning på barn- och ungdomsakuten.

Remissmallen på sidan 1 i detta dokument ska användas av BVC vid inremittering av dessa barn till BAKM. På sidan 2 finns handlägningsstöd till BAKM. Gråmarkerade fält ska fyllas i.

BAKGRUNDSINFORMATION

Barnets personnummer:	_____	Dagens datum:	_____
Moderns personnummer:	_____	Graviditetstidslängd:	_____
Har erhållit ljusbehandling mot neonatal ikterus:	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	
Föreligger tolkbehov?	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja, språk: _____	
Nutrition	<input type="checkbox"/> Huvudsakligen bröstmjolk	<input type="checkbox"/> Huvudsakligen bröstmjölksersättning	
Tillväxtdata bifogas	<input type="checkbox"/> Ja		

RISKSTRATIFIERING

Parameter	Normalt	Avvikande
Allmäntillstånd	<input type="checkbox"/> Normalt	<input type="checkbox"/> Avvikande (t.ex. slö, irriterad, febril)
Viktuppgång	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Avvikande
Avföringsfärg	<input type="checkbox"/> Gul, grön eller brun	<input type="checkbox"/> Vit, ljus beige eller ljus gul
Urinfärg	<input type="checkbox"/> Normalgul till ofärgad	<input type="checkbox"/> Mörk
Infektionstecken	<input type="checkbox"/> Föreligger ej	<input type="checkbox"/> Föreligger

ÅTGÄRD

Alla parametrar är normala	<input type="checkbox"/> Ej brådskande ikteruskategori
Någon parameter är avvikande	<input type="checkbox"/> Brådskande ikteruskategori

Ej brådskande ikteruskategori

- Remittera till BAKM nästa dag (mån-sön) kl. 08:00-09:00 då väntetiderna är som kortast.
- Bifoga denna checklista och tillväxtdata till remissen som i övrigt kan vara mycket kort.

Brådskande ikteruskategori

- Remittera till BAKM samma dag för provtagning och läkarundersökning.
- Bifoga denna checklista och tillväxtdata till remissen.

Denna sida fylls i av barn- och ungdomsakuten

Spädbarn med ikterus efter 2–3 veckors ålder, instruktion för barn- och ungdomsakuten

Triagera enligt retts-p och följ instruktionerna nedan.

EJ BRÅDSKANDE IKTERUSKATEGORI OCH GRÖN/GUL PRIORITET I RETTS-P

Sjuksköterska

- Ta endast *P-Bilirubin* och *P-Bilirubin, konjugerat*, med akutsvar. Obs: Ljuskänsligt prov.
- Skriv in som läkarbesök och markera med *vplabs* i patientliggaren.
- Familjen kan med fördel lämna BAKM i väntan på provsvar. Provsvar kan lämnas per telefon utan att barnet har läkarundersökts på BAKM. OBS: Notera i så fall telefonnummer nedan!
- Bevaka provsvaren. När provsvaren har kommit: Lämna denna blankett till läkaren tillsammans med remissen och tillväxtdata och meddela att provsvar är klara.

Telefonnummer där föräldern säkert nås: _____

Barn- och ungdomsjourläkare

- Bedöm provsvaren enligt separat PM. Om provsvaren är normala kan föräldern meddelas per telefon och behöver då inte komma in till akutmottagningen. Om provsvaren är avvikande behöver barnet komma in till akuten så att läkaren kan göra en bred bedömning med anamnes, status och eventuell vidare provtagning.
- Diktera. Vid normala provsvar kan anteckningen vara mycket kort enligt förslag nedan.
- Lägg denna blankett och retts-p-blanketten till sekreteraren för skanning.

Dikteringsmall, exempel vid normala fynd

Besökstyp	<i>Nybesök</i>
Kontaktorsak	<i>Snabbspår för spädbarn med prolongerad ikterus.</i>
Remiss från	<i>BVC [NN]</i>
Aktuellt	<i>Se inskannad remissmall. Inget avvikande på riskstratifieringsfrågorna.</i>
Lab	<i>Totalt P-Bilirubin: [X] µmol/L. Konjugerat P-Bilirubin: [Y] µmol/L.</i>
Bedömning	<i>Prolongerad ikterus hos [Z] veckor gammalt spädbarn som är välmående och har normal tillväxt. Prover ej patologiska. Friskt barn. Ytterligare provtagning behövs ej såvida inte andra tecken till sjukdom tillstöter.</i>
Huvuddiagnos	Välj en av följande: <i>P59.3, gulsot hos nyfödd på grund av bröstmjölksinhibitorer</i> <i>P59.0, gulsot hos nyfödd i samband med förlossning före beräknad tid</i> <i>P59.9, gulsot hos nyfödd av ospecificerad orsak</i>
Kopia till	<i>Inremitterande som remissvar</i>

BRÅDSKANDE IKTERUSKATEGORI ELLER ORANGE/RÖD PRIORITET I RETTS-P

Sjuksköterska

- Ta prover enligt retts-p.
- Skriv in som läkarbesök och meddela läkaren att barnet tillhör brådskande ikteruskategori samt vilken färg det fick i retts-p.

Barn- och ungdomsjourläkare

- Prioritera handläggningen av patienten enligt retts-p-färgen. Tänk brett.