

Delregion sydöstra - Intravenös antibiotikabehandling i samverkande hälso- och sjukvård i hemmet

Skapad av Mobilt team närsjukvård, Operativa arbetsgruppen sydöstra	Dokumentägare Operativa arbetsgruppen sydöstra	Typ av dokument Samverkansrutin	
Fastställd av Arbetsgrupp för i.v antibiotika i hemmet, delregion sydöstra	Fastställt datum 2026-09-09	Giltig t o m 2027-09-30	Reviderad datum

Bakgrund

Hos patienter med samverkande hälso- och sjukvård i hemmet kan intravenös antibiotikabehandling vara ett patientsäkert alternativ. För patienten innebär det en möjlighet att få stanna kvar hemma trots behov av intravenös antibiotikabehandling. Ofta krävs inte mer än någon eller några dagars behandling innan man kan övergå till peroral behandling. Rutinen utgår från Läke-medelrådets Regionala riktlinje gällande användning av intravenös antibiotika i hemmet, [Regional riktlinje gällande användning av intravenösa antibiotika i hemmet](#).

Syfte

Att utgöra ett praktiskt stöd för läkare och sjuksköterskor vid behandling med intravenös antibiotika i samverkande primärvård i hemmet.

Målgrupp

Personer boende på särskilt boende, LSS eller som vistas på korttidsboende.

Vem kan ordinera

Läkare på vårdcentral där patienten är listad samt läkare på Mobilt Team Närsjukvård Ystad (MTN).

Om ansvarig läkare på vårdcentral ordinerar behandling ska MTN kontaktas för att sjuksköterska i MTN ska ge första dosen.

Risakanalys

Läkare och sjuksköterska i kommunal primärvård ska tillsammans göra en riskbedömning för att bedöma om intravenös antibiotikabehandling i hemmet är patientsäker.

[Checklista gällande användning av intravenösa antibiotika i hemmet](#).

Medicinskt ansvar

I patientens journal ska det tydligt framgå vem som har det medicinska ansvaret för antibiotikabehandlingen. Ordination och behandlingsplan ska innehålla uppföljning samt åtgärder vid behandlingssvikt eller förändrat tillstånd, inklusive vem som ansvarar för beslut om fortsatt behandling, palliativ vård eller sjukhusvård.

Genomförande

Antibiotika som kan ordineras

- Cefotaxim
- Bensylpenicillin
- Ceftriaxon

Anafylaktisk reaktion

Säkerställ före administrering att beredskap finns för handläggning av eventuell anafylaktisk reaktion enligt gällande rutin och generell ordination.

Rekvirering av antibiotikadoser

MTN tar med sig antibiotika samt tillhörande material för administrering i samband med hembesök hos patienten.

För att undvika att levererade doser inte används ska rekvirering göras för max två dygns behandling vid ett tillfälle. Undantag kan göras för helgen, då rekvirering kan göras för hela helgen, inklusive första vardagens första dos.

Ansvarsfördelning mellan läkare och sjuksköterska

Läkarens ansvar

- Kontrollera eventuell registrerad antibiotikaallergi i journalen.
- Dokumentera ordination och behandlingsplan i patientens journal, inklusive uppföljning vid behandlingssvikt eller förändrat tillstånd.
- Säkerställ aktuell läkemedelslista och ordinaera intravenös antibiotikabehandling i Pascal (om det finns) annars PMO, enligt Läkemedelsrådets riktlinje gällande användning av intravenösa antibiotika i hemmet.
- Säkerställ att aktuella behandlingsbegränsningar finns dokumenterade.

Sjuksköterskans ansvar

- Se Pascal eller läkemedelslista för ordination och NPÖ för behandlingsplan.
- Säkerställ att aktuell läkemedelslista finns i patientens pärm.
- Arbeta aseptiskt (bevara det rena rent) och rengöra arbetsytan med ytdesinfektion med tensider.
- Använda adekvat skyddsutrustning och ha tillgång till ögondusch.
- Använd slutet system vid iordningställande och administrering av antibiotika.
- Dokumentera given dos och uppföljning i aktuell journal
- Stanna kvar hos patienten minst 15 minuter efter administrering.
- Kassera skyddsutrustning i avfallspåse direkt efter administrering. Påsen försluts och kasseras i hushållsavfall.
- Kassera läkemedel och slutet system som riskavfall.

Kompletterande dokument

Länkas från Vårdgivare Skåne Mobilt team närsjukvård

Läkemedelsrådets riktlinje gällande användning av intravenösa antibiotika i hemmet.

(vardgivare.skane.se)

Checklista gällande användning av intravenösa antibiotika i hemmet (vardgivare.skane.se)

Anafylaktiska reaktion – Kommunala basläkemedelsförråd och Generella direktiv

(vardgivare.skane.se)

Instruktion för iordningställande av intravenösa antibiotika i hemmet (Mobila team
närsjukvård/Lund - Vårdgivare Skåne)

Kasserade läkemedel. (vardhandboken.se). (länkas ej)