

VILKA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL MOT VÄRK OCH FEBER KAN JAG TA MED RIVASTIGMIN?

För att lindra tillfällig värk och feber kan du ta läkemedel som innehåller paracetamol. Detta under förutsättning att du inte redan använder läkemedel på recept som innehåller paracetamol. Äldre personer bör generellt undvika läkemedel innehållande ibuprofen, diklofenak, acetylsalicylsyra och naproxen om man inte blivit rekommenderad dessa av läkare. Är du osäker så ska du kontakta din läkare/sjuksköterska.

HUR SKA LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER RIVASTIGMIN FÖRVARAS?

Dessa läkemedel ska förvaras i rumstemperatur.

VEM SKA MAN PRATA MED OM MAN HAR FRÅGOR?


Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling, du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

INFORMATIONSBLAD OM LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER

RIVASTIGMIN

KAPSLAR

Framtagen av:
Hälsostaden Ängelholms sjukhus
Enheten för Kognitiv Medicin,
Specialistminnesmottagningen
Reviderad september 2018
www.skane.se



LÄKEMEDELSNAMN

Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller exakt samma verksamma ämne. När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apoteket blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen. De är därmed utbytbara med varandra. Lär dig namnet på det verksamma ämnet i ditt läkemedel.

HUR VERKAR LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER RIVASTIGMIN?

Läkemedlen verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin i hjärnan. Detta signalämne är bland annat viktigt för tankeförmågan, det vill säga hur hjärnan tar emot, bearbetar och förmedlar information.

VILKEN EFFEKT KAN MAN FÖRVÄNTA SIG?

Läkemedlet botar inte, men kan till exempel ge ökad uppmärksamhet, förbättra förmåga till inlärning och problemlösning samt förbättra språklig förmåga. Även förmågan att klara av dagliga aktiviteter kan förbättras. Effekten kan dock variera från person till person, varför årlig uppföljning görs för att utvärdera om behandlingen har nytta.

HUR SKA MAN TA LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER RIVASTIGMIN?

- På apoteketiketten står vilken dos du ska ta.
- Kapslar innehållande rivastigmin tas två gånger om dagen, morgon och kväll.
- Kapslarna bör tas tillsammans med mat, för att minska eventuella magbesvär.
- Kapslar brukar gå lättare att svälja om du först sväljer en klunk vätska.

VAD GÖR MAN OM MAN:

Glömt att ta en dos?

Om du glömmer bort att ta en kapsel, vänta till nästa doseringstillfälle och ta då en vanlig dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du glömmer flera doser, eller om du ofta glömmer bort att ta din medicin, kontakta din behandlande mottagning. Det finns möjlighet att få hjälp med dosett och/eller medicinutdelning.

Tagit dubbel dos?

Hoppa över den nästkommande ordinarie dosen, fortsätt sedan som vanligt. Känner du något obehag ska du kontakta läkare.

VILKA BIVERKNINGAR KAN RIVASTIGMIN GE?

En del personer får biverkningar av rivastigmin. Besvären varierar från person till person. Biverkningar kan till exempel vara illamående och/eller kräkningar, lös avföring, yrsel och aptitförlust. Som regel är dessa biverkningar övergående. Om du besväras av någon biverkan som inte går över, kontakta din läkare/sjuksköterska.

KAN MAN DRICKA ALKOHOL NÄR MAN TAR RIVASTIGMIN?

Allmän försiktighet beträffande alkoholintag rekommenderas vid sjukdom i hjärnan. Kombinationen alkohol och rivastigmin är inte specifikt studerad.