



Rimlighetskontroll i ePed för patienter med reservnummer.

För att rimlighetskontrollen i ePed ska fungera måste det finnas en ålder registrerad. På patienter med fullständigt personnummer hämtas åldern automatiskt. På patienter med reservnummer måste födelsedata vara ifyllt under meny Patientadm/ Patientuppgifter:



Födelsedata hämtas genom att man klickar på frågetecknet:



The screenshot shows the 'Patientuppgifter' form for patient 19 150318-DA0A TESTA, TEST. The form contains the following fields:

- Persnr: 19 150318-DA0A
- BFR: [checkbox]
- Födelsedat: [text field]
- [?] [button]


A red arrow points from the text above to the question mark button next to the birth date field.

Vid reservnummer är det födelsedata som beräkning av ålder sker ifrån. Om födelsedata inte är ifyllt sker ingen åldersberäkning eller rimlighetskontroll.



The screenshot shows the 'Rimlighetskontroll' dialog box. The dialog box has a blue header with the text 'Rimlighetskontroll'. Below the header, there are two buttons: 'Inaktiv' and 'Ingen ålder angiven'. The 'Ingen ålder angiven' button is highlighted with a red border.

Finns inte ålder registrerad måste doseringshjälpen i sätt in-dialogen öppnas manuellt genom att man klickar på plustecknet:



Sätt in

Impugan® Orala droppar, lösning 10 mg/ml Teva Sweden AB

Tillsats till:

Ordinationsorsak: Kommentar:

Datum: 2019-05-15 Administrationssätt: po Dosenhet: - Läkemedelsinstruktion: Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar Instruktion

Dosering +

Dosering (-): 0(20)

Skapa utd från första adm + -

Adm. tid	Dos

Maxdos: -/dygn Dosdispensering: Ej dosdisp Schema: dag Var: 1 dag


Pila (dagar): 0 Infusionshastighet:

Nyinsatt
 Skapa recept
 Sköter själv
 Skapa passerade utdelningstillfällen
 Föreslå ej synonymbyte

Anvisning:

OK Avbryt

Då ser man att rimlighetskontrollen är inaktiv:



Sätt in

Impugan® Orala droppar, lösning 10 mg/ml Teva Sweden AB

Tillsats till:

Ordinationsorsak: Kommentar:

Datum: 2019-05-15 Administrationssätt: po Dosenhet: - Läkemedelsinstruktion: Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar Instruktion

Dosering

Dos (-): Doseringsform: Dosering (-): 0(20)

Skapa utd från första adm

Adm. tid
Dos per kg
Dos i mängd verksam ...
Dos

Mätvärden

Ålder: uppgift saknas
Ord. vikt: 10.0 kg 190211
Reg. vikt: 10.0 kg >> Följ registrerad vikt

Rimlighetskontroll

Inaktiv Ingen ålder angiven

Maxdos: -/dygn Dosdispensering: Ej dosdisp Schema: dag Var: 1 dag
 m ti o to f l s

Pila (dagar): 0 Infusionshastighet:

Nyinsatt
 Skapa recept
 Sköter själv
 Skapa passerade utdelningstillfällen
 Föreslå ej synonymbyte

OK Avbryt

Finns ålder registrerad öppnas Doseringshjälpen och rimlighetskontrollen automatiskt.