

Manual Perifer venkateter (PVK)

Behovet av PVK ska kontinuerligt omprövas och insticksstället ska kontrolleras 3–4 gånger per dygn. För att underlätta följsamhet och uppföljning att PVK insticksställe inspekteras, finns en datumruta efter *Senaste inspektion*. Läs mer om dokumentation av PVK och rapportering i avvikelssystemet i [Regional riktlinje för byte av perifer venkateter](#).

Om ny PVK sätts, skapas en dublett av termen Perifer venkateter (i befintlig anteckning) med dokumentation enligt manual.

Perifer venkateter

Perifer venkateter

2022-01-10 07:35:22 Höger handrygg Storlek: Rosa, 1,1 Senaste inspektion: 2022-01-10 07:35:47 Utsatt:

(ej angivet) Komplikation: ingen komplikation

0 / 29 0 / 2000 [Zooma](#)

Term	Beskrivning	Typ	Val
Perifer venkateter		Datum/-tid	
		Egenskap/enval	Höger Vänster
	PVK-lokalisation vid inläggning.	Egenskap/enval	armveck fotrygg halsven handrygg skalpen underarm underben överarm

Term	Beskrivning	Typ	Val
Storlek	PVK; färg och storlek	Egenskap/enval	Lila, 0,6 Gul, 0,7 Blå, 0,9 Rosa, 1,1 Grön, 1,3 Vit, 1,5 Grå, 1,8 Orange, 2,0 2,2
Senaste inspektion	Tidpunkt för senaste inspektion av PVK-insticksställe. Vid ny inspektion dokumenteras nytt datum och klockslag genom att radera tidigare dokumenterad tidpunkt. Samtliga tidigare dokumenterade tidpunkter kan återläsas i historik/ändringsknapp 🗨️ Observera, för att kunna dokumentera tidpunkt för utsättande av PVK, måste det finnas en tidpunkt för Senaste inspektion.	egenskap/datum-tid	
Utsatt	Tidpunkt för utsättande av PVK	egenskap/datum-tid	
Komplikation	Typ av komplikation, vid avlägsnade av PVK	Egenskap/enval	ingen komplikation ömhet rodnad svullnad sekret ömhet, rodnad ömhet, rodnad, sekret ömhet, rodnad, hård kärlsträng :