



Skapa epikris som sjuksköterska med läkare som ansvarig


Skriv ut patienten via **Patientadm** och **Utskrivning**



Välj utskrivande läkare i bilden som kommer fram och tryck på OK.





Tryck på OK.




Tryck på OK igen.


Ta fram journalmappen via Historiksökningen



Markera den avslutade vårdkontakten och tryck på Journal



Dubbelklicka på Epikris, tvärprofessionell




Välj Epikris tvärprofessionell i boxen Mall och tryck därefter på OK




Fyll i vårdtiden (startdatum)

| 19 740408-AA2A KAJSA TEST | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2016-10-03 10:43 | EPIKRIS, TVÄRPROFESSIONELL | Ortopediavdelning 11 |
| | Läkare Läkare 1 | Läkare |
| Vårdtid | 2016-10-03 - | |
| Kontaktorsak | | |
| Anamnes | | |
| Undersökningar | | |
| Vårdförlopp | | |
| Planering | | |
| Aktuell läkemedelsbehandling | | |

Ängra därefter utskrivningen via **Patientadm** och **Ängra utskrivning**




Välj avdelning och sängplats. Tryck sedan på OK



Nu är det klart.

I journalen finns det nu en påbörjad epikris med en läkare som ansvarig. Det syns nu på journalmappen att vårdkontakten är pågående.



Dokumentation kan nu ske i den tvärprofessionella epikrisen.