


Att känna igen och häva en överdos

ATT KÄNNA IGEN EN ÖVERDOS

- Snarkande andning, oregelbunden eller ingen andning
- Blå om läppar och naglar
- Blek, kall, svag puls
- Medvetslös



VID OPIOIDÖVERDOS – GÖR SÅHÄR

1 MEDVETANDE? 	2 FRIA LUFTVÄGAR 	3 LARMA 	4 GE NALOXON
5 INBLÅSNING X 2 	6 FORTSÄTT Två inblåsningar var 10:e sekund 	7 INGEN EFFEKT – efter 2 minuter? Ge en dos Naloxon till. 2 min 	8 FORTSÄTT Två inblåsningar var 10:e sekund
9 STABILT SIDOLÄGE – när personen andas själv. Vänta på ambulans! 	NALOXON – nässpray mot opioidöverdos Du som är inskriven på någon av Region Skånes sprututbytesmottagningar eller beroendevårdsenheter, inklusive LARO-mottagningar, blir erbjuden naloxon nässpray tillsammans med en utbildning. Då är läkemedlet kostnadsfritt. Naloxon kan också skrivas ut av läkare på vårdcentralen till dig som använder opioider om du inte är inskriven på en sprututbytesmottagning eller beroendevårdsenhet. Då betalar du läkemedlet själv. Naloxon ingår i högkostnadsskyddet. Läs mer på 1177.se/naloxon-skane		

NALOXON (Naloxonhydroklorid) är ett läkemedel som kan rädda liv vid överdos av opioider. I väntan på ambulans kan naloxon tillfälligt häva andningsuppehåll vid opioidöverdos. Naloxon är ofarligt att få i sig av misstag och helt verkningslöst utan opioider i kroppen.

