




Överdosis – gör så här

<p>1 MEDVETANDE?</p> 	<p>2 FRIA LUFTVÄGAR</p> 	<p>3 LARMA</p> 
<p>4 GE NALOXON</p> 	<p>5 INBLÄSNING X 2</p> 	<p>6 FORTSÄTT 2 INBLÄSNINGAR var tionde sekund</p> 
<p>7 INGEN EFFEKT – efter 2 minuter? Ge en dos Naloxon till.</p> <p>2 min</p> 	<p>8 FORTSÄTT INBLÄSNINGAR – var 10:e sekund</p> 	<p>9 STABILT SIDOLÄGE – när personen andas själv. Vänta på ambulans!</p> 

Region Skånes naloxonprogram


Känn igen en opioidöverdos:

- Snarkande andning, oregelbunden andning eller ingen andning
- Blå om läppar och naglar
- Blek, kall, svag puls
- Medvetslös




1

MEDVETANDE?



2 FRIA LUFTVÄGAR




3 LARMA




4

GE NALOXON



5


INBLÅSNING X 2



6

FORTSÄTT


Två inblåsningar
var tionde sekund



7

INGEN EFFEKT


– efter 2 minuter?
Ge en dos naloxon till.



8

FORTSÄTT INBLÅSNINGAR


– var 10:e sekund



9


STABILT SIDOLÄGE

– när personen andas
själv. Vänta på ambulans.



Naloxon


Naloxon är ett **motgift** som **tillfälligt** kan ta bort effekten av opioider. Naloxon är **ofarligt** och verkar endast om man har opioider i kroppen.



Den andningshämmande effekten av opioider kan hävas med hjälp av naloxon eftersom naloxon binder starkare till opioidreceptorerna.

Opioider

En effekt av opioider är att de kan ge andningsuppehåll som kan leda till syrebrist, medvetslöshet, hjärtstopp och död.



Samtliga opioider, till exempel heroin, morfin, opium, fentanyl, metadon, tramadol, kodein och oxycodon, verkar på opioidreceptorer i hjärnan.

NALOXON (Naloxonhydroklorid) är ett läkemedel som kan rädda liv i väntan på ambulans. Naloxon erbjuds alla som är inskrivna på sprutbyten, LARO-mottagningar eller andra beroendevårdsenheter i Region Skåne. I samband med att naloxon skrivs ut ges en kort utbildning om när och hur naloxon används och vad man gör vid en överdos.

Naloxonprogrammets syfte är att öka möjligheten att förebygga dödsfall och allvarliga skador till följd av opioidöverdos.




Risksituationer

- Att blanda droger, alkohol och läkemedel
- Att ta droger ensam – då finns ingen hjälp att få
- Efter droguppehåll – då tål man inte lika mycket
- Att tidigare ha drabbats av överdos

- Att ta större mängd än man brukar
- Att ta preparat med lång halveringstid
- Att ta svärdoserade preparat
- Att ta läkemedel som ordinerats till annan
- Att ta substanser med oklart innehåll



Region Skånes naloxonprogram



Sökord på internet: Naloxon Region Skåne
www.1177.se/naloxon-skane

