

## Tecken på allvarlig infektion hos barn

	<b>Låg risk</b> Grönt ljus	<b>Medelhög risk</b> Gult ljus – ett symtom räcker, flera symtom innebär högre risk	<b>Hög risk</b> Rött ljus – ett symtom räcker för bedömning hög risk										
<b>Allmäntillstånd</b>	Barnet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• svarar normalt på sociala signaler</li> <li>• är alert eller lättväckt</li> <li>• är nöjt eller ler</li> <li>• skriker starkt och normalt eller inte alls</li> </ul>	Barnet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• svarar inte normalt på sociala signaler</li> <li>• är vaken men trött och hängig</li> <li>• har nedsatt aktivitetsnivå</li> <li>• är väldigt missnöjt</li> </ul>	Barnet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• reagerar inte på undersökningen</li> <li>• vaknar inte eller väcks men somnar igen</li> <li>• gnyr eller skriker svagt, gällt eller kontinuerligt</li> <li>• är allvarligt sjukt enligt föräldrarna eller läkares bedömning/intuition</li> </ul>										
<b>Kroppstemperatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afebril eller feber som inte uppfyller gult eller rött ljus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spädbarn 3–6 månader med feber <math>\geq 39,0</math> °C</li> <li>• Barn med feber i &gt; 5 dagar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spädbarn &lt; 3 månader med feber <math>\geq 38,0</math> °C</li> <li>• Barn i alla åldrar med feber &gt; 41,0 °C</li> <li>• Spädbarn &lt; 1 år med temperatur &lt; 36,0 °C (hypotermi)</li> </ul>										
<b>Andningsfrekvens</b> (andetag/minut)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal andning</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td>&lt; 2 mån</td> <td>&gt; 60</td> </tr> <tr> <td>2–12 mån</td> <td>&gt; 50</td> </tr> <tr> <td>1–2 år</td> <td>&gt; 40</td> </tr> <tr> <td>3–5 år</td> <td>&gt; 35</td> </tr> <tr> <td><math>\geq 6</math> år</td> <td>&gt; 30</td> </tr> </table>	< 2 mån	> 60	2–12 mån	> 50	1–2 år	> 40	3–5 år	> 35	$\geq 6$ år	> 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Takypné (&gt; 60)</li> <li>• Kvidande eller gnyende andning ("grunting")</li> <li>• Kraftiga indragningar</li> </ul>
< 2 mån	> 60												
2–12 mån	> 50												
1–2 år	> 40												
3–5 år	> 35												
$\geq 6$ år	> 30												
<b>Hjärtfrekvens</b> (hjärtslag/minut)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal hjärtfrekvens</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td>&lt; 1 år</td> <td>&gt; 160</td> </tr> <tr> <td>1–2 år</td> <td>&gt; 150</td> </tr> <tr> <td>2–5 år</td> <td>&gt; 140</td> </tr> </table> <p>Tillfällig takykardi är vanligt vid skrik, oro eller feber hos barnet.</p>	< 1 år	> 160	1–2 år	> 150	2–5 år	> 140	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ihållande takykardi</li> </ul>				
< 1 år	> 160												
1–2 år	> 150												
2–5 år	> 140												
<b>Handläggning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barnet kan åka hem med allmänna råd och vid behov behandling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barnet kan åka hem med säkerhetsnät eller bedömas akut på sjukhus. Samråd gärna med barnläkare.</li> <li>• Säkerhetsnät – informera om förväntat sjukdomsförlopp, vilka symtom som bör observeras och när vården bör kontaktas igen</li> <li>• Planera för uppföljning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barnet bör bedömas akut på sjukhus de flesta fall</li> </ul>										