

Specifika tillstånd

Faktaägare: Granquist Åsa
Dokumentförvaltare: Areskoug Christian
Styrande dok (ej labmedicin), (ST) Riktlinje

Gäller för: Region Skånes Ambulanssjukvård

7.16 Ögonskador

- Penetrerande föremål ska inte tas bort.
- Vid etsande/frätande exponering till exempel syra, lut eller innehåll från airbag: Skölj rikligt med mjuk stråle Ringer-Acetat under hela transporten. Lyft vid behov upp ögonlocket för att spola rent.
- Vid svåra ögonsmärtor kan patienten ges ögondroppar Oxibuprokain 0,4 % (4 mg/ml), 1 droppe i skadat öga 1–3 gånger med cirka 30 sekunders mellanrum. Täck över ögat efter administration. Vid ”öppna” ögonskador, dvs penetrerande trauma bör detta undvikas. Smärtlindra på annat sätt vid dessa fall.
- Vid bulbperforation, ge antiemetika förebyggande. Ondansetron 2mg/ml, 2 ml iv. Kräkningar ökar det intraokulära trycket och kan i värsta fall förvärra skadan.
- Alla patienter som behandlats med Oxibuprocain skall bedömas av ögonläkare och aktas för vinddrag eller blåst.
- Vid symptomgivande exponering av tårgas eller pepparspray skall hela ansiktet sköljas rikligt med vatten/Ringer-Acetat.