

Algoritmer

Faktaägare: Granquist Åsa
Dokumentförvaltare Granquist Åsa
Styrande dok (ej labmedicin), (ST) Riktlinje

Gäller för: Region Skånes Ambulanssjukvård

8.10 PreHAST vuxen

- **Med vaken patient** menas RLS 1-2
- **Förståelse** Värderar språkförståelse (impressiv afasi) och förmåga att utföra mer komplexa rörelser (apraxi)
- **Ögonställning** Värdering av ofrivillig riktning av blicken åt ena sidan (blickdeviation, déviation conjugée). Tyder på utbredd, allvarlig påverkan av hjärnan.
- **Synfält** Testet ska utföras i både höger och vänster synfält samtidigt Detta förenklade test kommer därmed att värdera både hemianopsi och neglekt. Båda symptomen är allvarliga
- **Facialis pares** Värdering av ansiktsförlamning. Det tidigaste tecknet på ansiktsförlamning är att fåran mellan näsvinge och mungipa slätas ut.
- **Pares i arm**
- **Pares i ben**
- **Känsl** Smärtsinnet testas med lätta "nyp" och skall utföras först i armveck och sedan knäveck.
- **Tal och språk** Normal/Påverkad språkförmåga/Svår påverkan. Om patienten ej talar svenska förlita er på uppgifter från anhörig där så är möjligt.

Om PreHAST inte ger något utfall och du ändå misstänker att patientens symptom beror på stroke tag kontakt med strokejour. Vid osäkerhet kan RLS kontaktas.