

9.0 Glukos

Preparatnamn:	Glukos
Beredningsform:	Infusionsvätska: 50 mg/ml (5%) Injektionslösning: 100 mg/ml (10%), 300 mg/ml (30%)
Styrka:	50 mg/ml (5%), 100 mg/ml (10%), 300 mg/ml (30%)
Terapeutisk effekt:	
Indikationer:	Glukos ges vid hypoglykemiska tillstånd. Om iv-access är svår att uppnå, överväg glukagon istället för io-access. Glukos har viss smärtlindrande effekt på barn under 6 mån, inför till exempel PVK-sättning.
Administrationssätt:	IV, PO
Dosering vuxna:	Sätt infusion 250 ml 50 mg/ml (5%) glukos iv, därefter ges 20 ml 300 mg/ml (30%) glukos som kan upprepas tills patienten vaknar.
Dosering barn:	Hypoglykemi 100 mg/ml (10%), glukos, 2 ml/kg iv. Kan upprepas vid fortsatt hypoglykemi. Efterföljs av 50 mg/ml (5%) glukos iv. Smärtlindring vid nålsättning på spädbarn. Använd 300 mg/ml (30%) glukos, droppvis upp till 2 ml po. Gärna i kombination med napp med tanke på sugreflexen.
Kontraindikationer:	
Försiktighet:	
Biverkningar:	