

9.0 Ketamin

Preparatnamn:	Ketalar
Beredningsform:	Injektionslösning
Styrka:	10 mg/ml
Terapeutisk effekt:	Dissociativt anestetikum med starkt analgetisk effekt. I högre doser fås anestetisk effekt. Bör kombineras med en liten dos Midazolam för lindring av hallucinogena biverkningar. Ketamin kan ge ökad salivering vilket vid behov kan behandlas med Atropin.
Indikationer:	Kan ges i analgetisk dos till exempel vid förflyttning, innan reponering av isolerade extremitetsfrakturer och vid andra tillfällen då övriga smärtstillande läkemedel inte bedöms räcka till.
Administrationssätt:	Intranasalt, im eller långsamt iv. Eftersträva lugn och tyst miljö.
Dosering vuxna:	Analgesi Maximal dos 0,5 mg/kg. Kan upprepas när effekten börjar klinga av efter 15–20 min, oftast räcker då halva laddningsdosen. Överväg annat analgetikum innan effekten avtar. För analgesi krävs kunskap om preparatet. Anestesi Doserar efter önskat anestesi djup enligt FASS. För anestesi/sedering krävs formell och klinisk kompetens.
Dosering barn:	Analgetisk dos: 0,1–0,2 mg/kg iv. Vid behov rådgör med RLS. Analgetisk dos intranasalt 0.5 mg/kg (barn>1år) Användes som alternativ till in. Fentanyl för att tex undvika andningsdepression
Kontraindikationer:	Överkänslighet mot läkemedlet, patienter hos vilka en höjning av blodtrycket utgör en allvarlig risk, eklampsi och preeklampsi.
Försiktighet:	Myokardischemi/hjärtinfarkt, hypertension, takyarytmier, alkoholintoxikation, psykos, hypertyreoidism, lunginflammation eller övre luftvägsinfektion, skallskada, ögonskada.
Biverkningar:	