

## Läkemedel

**Faktaägare:** Granquist Åsa  
**Dokumentförvaltare:** Aspelund Johan  
Styrande dok (ej labmedicin), (ST) Riktlinje

**Gäller för:** Region Skånes Ambulanssjukvård

## 9.0 Oxycodon

<b>Preparatnamn:</b>	Oxynorm
<b>Beredningsform:</b>	Kapsel hård: 5 mg.
<b>Styrka:</b>	5 mg,
<b>Terapeutisk effekt:</b>	Medelstark opioid.
<b>Indikationer:</b>	Medelsvår till svår smärta där venös access är svår/olämplig att uppnå.
<b>Administrationssätt:</b>	Po
<b>Farmakokinetik:</b>	tid till Cmax 1-1,5h. t ½ 3 h
<b>Dosering vuxna:</b>	1 kapsel 5 mg <b>Skall ej upprepas.</b>
<b>Dosering barn:</b>	
<b>Kontraindikationer:</b>	Känd allergi mot oxycodon, andningsdepression, KOL, astma, skallskada, amning, cor pulmonale, paralytiskt ielus.
<b>Försiktighet:</b>	Graviditet, särskilt vid nära förestående förlossning, myastenia gravis, missbruk, samtidig alkohol användning.
<b>Biverkningar:</b>	Psykiska störningar, yrsel, huvudvärk, somnulens, förstoppning, illamående, kräkningar andningspåverkan, klåda.
<b>Interaktioner</b>	Se FASS.