

## 9.0 Paracetamol

<b>Preparatnamn:</b>	Panodil, Alvedon
<b>Beredningsform:</b>	Tablett, Infusionsvätska, Supp
<b>Styrka:</b>	Tablett: 500 mg.  Infusionsvätska: 10 mg/ml.  Supp: 125, 250 mg.
<b>Terapeutisk effekt:</b>	Paracetamol har smärtstillande effekt genom påverkan på flera system, bland annat genom att motverka aktiveringen av perifert cyklooxygenas.
<b>Indikationer:</b>	Analgetikum som kan användas vid de flesta smärttillstånd samt som febernedsättande. Paracetamol iv vanligen mer potent än de andra beredningsformerna och kan användas om patienten har svårt att svälja eller om man vill minska behovet av opioider.
<b>Administrationssätt:</b>	po, pr, iv.
<b>Dosering vuxna:</b>	Tablett och infusionsvätska 1 g, maximal dos 4 g per dygn.
<b>Dosering barn:</b>	<b>Maximal dygnsdos:</b> 60 mg/kg kroppsvikt  <b>Tablett och supp:</b> 10-15 mg/kg.  <b>Infusionsvätska 10 mg/ml:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• fullgångna barn &lt; 10 kg 7,5 mg/kg</li><li>• barn &gt;10 kg 15 mg/kg</li></ul>
<b>Kontraindikationer:</b>	Ej till prematura spädbarn.  Får inte användas om patienten fått fulldos paracetamol, vilket även finns i till exempel Citodon. Svår leversvikt. Överkänslighet mot paracetamol.
<b>Försiktighet:</b>	Leversvikt, svår njursvikt, kronisk alkoholism, dehydrering, kronisk undernäring, favism.
<b>Biverkningar:</b>	