

## 9.0 Salbutamol

<b>Preparatnamn:</b>	Ventoline
<b>Beredningsform:</b>	Inhalationsvätska
<b>Styrka:</b>	2 mg/ml
<b>Terapeutisk effekt:</b>	Beta-receptorstimulerare med selektiv effekt på bronkernas beta-2-receptorer, som ger bronkdilatation. Den bronkdilaterande effekten inträder inom ett par minuter efter inhalation och når maximal effekt efter 30–60 minuter.
<b>Indikationer:</b>	Astma, KOL eller obstruktivitet av annan orsak, ges innan Budosenid. Rök/brandskada.
<b>Administrationssätt:</b>	Inhalation via nebulisator.
<b>Dosering</b>	vuxna 5 mg (2,5 ml). Kan upprepas
<b>vuxna</b>	
<b>barn</b>	Man får inte säkert effekt av Salbutamol till barn < 1 år och det är därmed svårt att rekommendera doser till barn i dessa åldrar. Som alternativ till de allra minsta kan man vid obstruktion försiktigt inhalera med adrenalin.  < 3 år 1,25 ml + 1,25 ml Na Cl (0,9%) 30-60 s  3–12 år: 1,25 ml + 1,25 ml Na Cl (0,9%)  > 12 år: 5 mg (2,5 ml)  Kan upprepas
<b>Kontraindikationer:</b>	Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
<b>Försiktighet:</b>	
<b>Biverkningar:</b>	