

Läkemedel

Faktaägare: Granquist Åsa
Dokumentförvaltare: Areskoug Christian
Styrande dok (ej labmedicin), (ST) Riktlinje

Gäller för: Region Skånes Ambulanssjukvård

9.0 ~~Kodein, metylskopolamin, morfin, noskapin, papaverin~~

Preparatnamn:	Spasmofen UTGÅR SOMMAR 2020. BEHANDLINGSRIKTLINJE UPPDATERAD
Beredningsform:	Injektionsvätska
Styrka:	
Terapeutisk effekt:	Ett kombinationspreparat av metylskopolaminnitrat och opiumalkaloider motsvarande ett totalextrakt av opium förstärkt med papaverin. Främst smärtstillande och antikolinerga effekter. Antidot mot opioidkomponenterna: naloxon.
Indikationer:	Andrahandsmedel vid stensmärta när diklofenak inte kan ges av någon anledning eller har givits med otillräcklig effekt. (VAS \geq 5 efter 15 min)
Administrationssätt:	sc, långsamt iv.
Dosering vuxna:	1 ml
Dosering barn:	-
Kontraindikationer:	Överkänslighet mot något av de ingående ämnena, amning, skallskada, andningsinsufficiens.
Försiktighet:	Astma, cirkulationspåverkan, nära förestående förlossning, myastenia gravis.
Biverkningar:	