

9.0 Syrgas-Lustgas (O₂-N₂O)

Preparatnamn:	Niontix
Beredningsform:	Gas
Styrka:	50% N ₂ O / 50% O ₂
Terapeutisk effekt:	Analgetiska och sederande egenskaper
Indikationer:	Akuta smärttillstånd, till exempel inför reponering av frakturer och PVK-sättning hos både vuxna och barn över 1 år. Akut förlossning.
Administrationssätt:	Administreras via mask som patienten själv håller.
Dosering Alla > 1 år	Självalministrerat.
Kontraindikationer:	Barn < 1 år Pneumothorax, skall/ansiktsskador, medvetandesänkning (RLS 3–8), penetrerande ögonskador, inhalationsbrännskador och buksmärta.
Försiktighet:	Lustgas skall endast användas med adekvat ventilation och/eller utsugsutrustning för att undvika höga lustgaskoncentrationer i den omgivande luften.
Biverkningar:	Illamående, yrsel, <i>psykos o andningsdepression</i>
Överdoserings:	Om patienten visar tecken på sjunkande vakenhetsgrad, inte svarar adekvat på tilltal eller på annat sätt uppvisar tecken till uttalad sedering skall administreringen omgående avbrytas. Patienten skall andas "frisk luft" vid behov även extra syrgas. Övervakning med pulsoximetri tills dess att patienten återfått medvetandet och ej längre är hypoxisk. Patienten skall inte erhålla ytterligare lustgas förrän tidigast då medvetandet helt återkommit.