

9.0 Terbutalin

Preparatnamn:	Bricanyl
Beredningsform:	Injektionslösning
Styrka:	0,5 mg/ml
Terapeutisk effekt:	Terbutalin är en adrenerg beta-2-receptorstimulerare som genom selektiv stimulering av beta-2-receptorer ger bronkdilatation och uterusrelaxation.
Indikationer:	För lindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom hos patienter som inte orkar inhalera. För korttidsbehandling av prematurt värkarbete eller vid navelsträngs prolaps, ges efter ordination av förlossningsjour eller i undantagsfall RLS.
Administrationssätt:	sc
Dosering vuxna:	Obstruktiva andningsbesvär Om patienten ej orkar inhalera ges injektion 1 ml sc. Navelsträngs prolaps, prematurt värkarbete Injektion 0,5 ml sc efter läkarordination.
Dosering barn:	-
Kontraindikationer:	Vid prematurt värkarbete är Bricanyl kontraindicerat vid följande indikationer: <ul style="list-style-type: none">• tillstånd vid en gestationsålder på <22 veckor.• hotande abort under första och andra trimestern.• tillstånd hos moder eller foster där förlängning av graviditeten är riskfylld, till exempel svår toxemi, intrauterin infektion, vaginal blödning till följd av placenta praevia, eklampsi eller svår preeklampsi, ablatio (placentaavlossning) eller avelsträngskompression. Bricanyl är också kontraindicerat vid pulmonell hypertension och hjärtsjukdomar såsom obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati eller aortastenosis vilket är vanligt hos KOL-patienten.
Försiktighet:	
Biverkningar:	