

9.0 Tranexamsyra (TXA)

Preparatnamn:	Cyklokapron®
Beredningsform:	Injektionsvätska
Styrka:	100 mg/ml
Terapeutisk effekt:	Tranexamsyra utövar en hämmande effekt på plasminogenaktiveringen, d v s omvandlingen av plasminogen till plasmin och hjälper därmed till att behålla det bildade blodkoaglet längre och minskar därmed sannolikt blödningen.
Indikationer:	<p>TXA ges IV eller IO vid stark klinisk misstanke på inre, icke kompressibel traumatisk blödning med eller utan cirkulatorisk påverkan.</p> <p>TXA kan även ges vid postpartumbloodning och GI-blödning med cirkulatorisk påverkan. Andra indikationer kan vara aktuella, kontakta RLS för ordination. OBS, ges ej vid hematuri.</p>
Administrationssätt:	Intravenös injektion (iv) eller intraosseös injektion (IO)
Dosering vuxna:	<p>Vuxen ≥14 år 10 ml (=1 g) iv ges långsamt, ca 1 ml/min, så snart efter traumat som möjligt.</p> <p>1 g kan tillsättas till 100 ml NaCl för infusion på 10 min.</p> <p>Får ges senast 3h efter skadetillfället.</p>
Dosering barn:	Inj tranexamsyra 100mg/ml, 15mg/kg iv 1ml/min.
Kontraindikationer:	<ul style="list-style-type: none">• Aktiv tromboembolisk sjukdom• Överkänslighet mot Tranexamsyra• Hematuri (koaglerna som bildas i blåsan ger urinretention)
Försiktighet:	Under inga omständigheter får administrering av Cyklokapron fördröja transport av patienten till sjukhus.
Biverkningar:	<ul style="list-style-type: none">• Lågt blodtryck kan uppträda efter för snabb IV/IO injektion, dvs ge på ca 10 min.• Illamående/kräkningar kan uppträda efter för snabb iv/io injektion• Hudutslag