

Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2022-05-05
Riktlinjen är giltig t o m 2024-05-05

Spädningsschema icke-antibiotika vuxen

Allmänna instruktioner och kommentarer till spädningsschemat

- Spädningsschemat är framtaget för vuxna, och är en rekommendation. Det kan finnas andra sätt att späda.
- Undvik administrering i samma infart/lumen som annat läkemedel (inkl. elektrolyter och TPN) om inte kompatibiliteten är känd. För kompatibilitetsfrågor, kontakta farmaceut.
- För narkotiska preparat beakta säkerhet och kontroll av den spädda injektionslösningen som eventuellt sparas eller destrueras. Rutin för detta bör beskrivas i lokal rutin.
- NaCl = Natriumklorid 9 mg/mL injektions-/infusionsvätska

Rutinen gäller enbart intravenös administrering, för spädning vid andra möjliga administreringsvägar hänvisas till preparatens produktresuméer eller andra rutiner.

Observera att denna instruktion enbart beskriver iordningsställande och administration, och inte ersätter FASS eller tillverkarens rekommendationer i vad övrigt som behöver beaktas under och/eller efter administrering av respektive preparat. Det förutsätts även att visuell kontroll görs innan administrering kan ske.

Substans (läkemedel)	Dos/styrka	Administreringsväg	Spädning	Slutkoncentration
Ketobemidon (Ketogan Novum)	5 mg/mL	Intravenös injektion	1 mL ketobemidon späds med 4 mL NaCl	1 mg/mL
Klonidin (Catapresan, Catapres Ebb)	150 mikrog/mL	Intravenös injektion	1 mL klonidin späds med 9 mL NaCl	15 mikrog/mL
Morfin (Morfin Abcur/Meda/Kalceks/Special)	10 mg/mL	Intravenös injektion	1 mL morfin späds med 9 mL NaCl	1 mg/mL
Oxikodon (Oxycodone Hameln, OxyNorm)	10 mg/mL	Intravenös injektion	1 mL oxikodon späds med 9 mL NaCl	1 mg/mL

Författare

Workstream Medications, SDV.

Granskad av LAG läkemedel hjärt- och kärlsjukdomar och LAG läkemedel smärta