

UPPTRAPPNINGSSCHEMA ENTERAL NUTRITION KONTINUERLIG TILLFÖRSEL MED PUMP

Personnr: _____ Namn: _____

Energibehov: _____ kcal/dygn

Vätskebehov: _____ ml/dygn

Infartstyp, satt den _____

- nasogastrisk sond PEG gastrostomiport gastrostomitub
 nasojejunal sond jejunostomikateter annan _____

Mål ordination: _____

Individuell bedömning av energi- och näringsbehov måste alltid göras. För ordination av sondmatsregim konsulteras dietist/läkare.

Vid jejunal tillförel är maxhastigheten 125 ml/h för flertalet patienter. För övriga infarter ökas hastigheten successivt efter dag 6 med 25 ml/h per dygn till önskad hastighet. Vid toleransproblem (ex diarré, illamående) avvakta fortsatt upptrappning eller återgå till föregående dags regim tills symptomen avklingat.

Dag	Datum	Hastighet (ml/h)	Antal timmar	Mängd per dygn	Extra vätska per dygn
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Tänk på att:

- Ha höjd huvudända (minst 30°) under pågående tillförel samt 30–40 min efter den avslutats
- Ta hänsyn till eventuellt peroralt intag
- Observera munstatus. Behöver patienten hjälp med munvård?
- Fråga efter förstoppning/diarré
- Nattfastan inte bör vara längre än 11 timmar
- Flertalet patienter behöver extra vätska även efter upptrappningen eftersom sondnäringar endast innehåller ca 80% vätska.