

SMITTSKYDDSBLAD

Patientinformation

Latent tuberkulos när behandling ges

Version 2020-07-24 (byt ut till aktuell version)

Piilevä (latentti) tuberkuloosi, tietoa potilaille**Ajanjakso, jolloin ehkäisevää hoitoa annetaan. Tartuntasuojalääkäreiden tiedote****Miten tuberkuloosi tarttuu?**

Keuhkotuberkuloosia sairastava voi tartuttaa taudin muihin yskiessään sisätiloissa. Muissa elimissä oleva tuberkuloosi ja piilevä tuberkuloosi eivät tartu muihin. On harvinaista, että alle murrosikäiset lapset tartuttavat tautia. Tarttumisvaara on suurin silloin kun oleskelee pitemmän ajan samassa huoneessa, esimerkiksi samassa kotitaloudessa, kuin tartunnan saanut.

Mikä on piilevä tuberkuloosi?

Kaikki tartunnan saaneet eivät välttämättä sairastu tuberkuloosiin. Useimmilla henkilöillä kehon oma puolustuskyky pystyy estämään bakteerien kasvamisen. Bakteereja voi jäädä kehoon, mutta ne eivät ole aktiivisia. Tätä tilaa kutsutaan **piileväksi tuberkuloosiksi**.

Piilevä tuberkuloosi ei ole mikään sairaus

Sinulla, joka olet saanut verikokeen (IGRA-testi) tai ihotestin (tuberkuliinikoe) jälkeen tiedon, että sinulla on piilevä tuberkuloosi, ei ole mitään tuberkuloosista johtuvia sairauden oireita. Et pysty levittämään näitä bakteereita edelleen toisiin ihmisiin.

On kuitenkin olemassa riski tuberkuloosiin sairastumisesta elämän myöhemmässä vaiheessa, mutta se riski on vähäinen.

Ehkäisevää hoitoa annetaan tietyissä tapauksissa

Tietyille ihmisille, joilla on lisääntynyt riski sairastua myöhemmin, tarjotaan ehkäisevää hoitoa. Tämä koskee ensisijaisesti raskausaikaa synnyttämisen jälkeen, lapsia ja nuoria sekä niitä, joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä esimerkiksi syöpähoidon, insuliinilla hoidettavan diabeteksen tai vaikean munuaissairauden aikana. Ehkäisevää hoitoa annetaan toisinaan myös niille, jotka ovat vasta altistuneet tuberkuloositartunnalle.

Sinulle suositellaan ehkäisevää hoitoa

Sinulla on piilevä tuberkuloosi ja lääkärisi suosittelee sinulle ennalta ehkäisevää hoitoa. Tätä suositellaan riskin vähentämiseksi siitä, että sairastuisit joskus tulevaisuudessa tuberkuloosiin.

Jos sairastut joskus tulevaisuudessa pitkäaikaiseen yskään (pitempään kuin kolme viikkoa), yöhikoiluun, kuumeeseen tai laihtut sitä haluamatta, ota yhteys lääkäriisi tuberkuloositutkimuksia varten.

Yhteystiedot (Kontaktuppgifter)

Vastaanoton nimi (*Namn på mottagningen*)

.....

Olet tavannut seuraavat henkilöt (*Du har träffat*)

..... Lääkäri (*Läkare*)

..... Sairaanhoidtaja (*Sjuksköterska*)

Vastaanoton puhelinnumero ja -aika (*Telefonnummer/telefonid till mottagningen*)

.....