

## SMITTSKYDDSBLAD

## Patientinformation

Latent tuberkulos när behandling ges

Version 2022-04-11

**Tuberculose latente, informações para pacientes****Quando é administrado um tratamento preventivo. Ficha de informação dos médicos de prevenção e controlo de doenças infecciosas****Como a tuberculose se transmite?**

Uma pessoa com tuberculose pulmonar pode contagiar outras pessoas ao tossir em espaços interiores. A tuberculose em outros órgãos do corpo e a tuberculose latente não são contagiosas. As crianças pré-púberes raramente são contagiosas. O risco de contágio é maior quando se permanece muito tempo no mesmo ambiente, por exemplo, ao partilhar a mesma habitação.

**O que é a tuberculose latente?**

Nem todas as pessoas infetadas com tuberculose desenvolvem a doença. Na maior parte dos casos, o sistema imunitário consegue conter a multiplicação das bactérias infecciosas. As bactérias podem permanecer no corpo, mas num estado inativo. Esta situação é denominada **tuberculose latente**.

**A tuberculose latente não é uma doença**

Se após uma análise sanguínea (teste IGRA) ou um teste cutâneo tuberculínico tiver sido diagnosticado(a) com tuberculose latente, isso significa que é assintomático(a) e que não pode transmitir as bactérias da tuberculose a outras pessoas.

No entanto, há o risco de desenvolver a doença na forma ativa numa fase posterior da vida, mas esse risco é pequeno.

**Em alguns casos é administrado um tratamento preventivo**

A certas pessoas suscetíveis de contraírem a doença numa fase posterior é sugerido um tratamento de prevenção. Tal aplica-se, em primeiro lugar, em casos de gravidez e pós-parto, a crianças e adolescentes e a pessoas com sistema imunitário fragilizado, por exemplo, na sequência de tratamentos do cancro, insulínoddependência ou doenças renais graves. Por vezes, o tratamento preventivo é também administrado em casos de exposição recente à infeção tuberculosa.

**Foi-lhe recomendado(a) um tratamento preventivo**

Foi diagnosticado(a) com tuberculose latente e o seu médico recomendou um tratamento preventivo com vista a reduzir o risco de no futuro adoecer com tuberculose.

Se, no futuro, sentir sintomas como tosse persistente (durante mais de três semanas), suores noturnos, febre ou perda involuntária de peso, deve contactar o seu médico para uma consulta de rastreio de infeção tuberculosa.

**Dados de contacto (*Kontaktuppgifter*)**

Nome do consultório (*Namn på mottagningen*) .....

Foi atendido(a) por (*Du har träffat*)

..... Médico(a) (*Läkare*)

..... Enfermeiro(a) (*Sjuksköterska*)

Número de telefone/horário de atendimento telefónico do consultório (*Telefonnummer/telefonid till mottagningen*)

.....