

# SMITTSKYDDSBLAD

## Patientinformation

Latent tuberkulos när behandling ges

Översatt till rumänska

Version 2022-04-11

### Tuberculoză latentă, informații pentru pacienți

#### Când se administrează tratament preventiv? Fișele de informare ale medicilor epidemiologi

##### Cum se transmite tuberculoza?

O persoană cu tuberculoză la plămâni poate infecta alte persoane atunci când tușește în spații închise. Tuberculoza la alte organe și tuberculoza latentă nu sunt contagioase. Este neobișnuit ca copiii prepuberi să fie contagioși. Riscul de infecție este cel mai mare în cazul persoanelor care petrec mult timp în aceeași cameră, de exemplu cei care locuiesc în aceeași gospodărie.

##### Ce este tuberculoza latentă?

Nu toți cei care sunt contaminați se îmbolnăvesc de tuberculoză. La majoritatea persoanelor, mijloacele de apărare ale organismului pot opri înmulțirea bacteriilor. Bacteriile pot rămâne în organism, dar nu sunt active. Această afecțiune se numește **tuberculoză latentă**.

##### Tuberculoza latentă nu este o boală

Tu, cel/cea care după un test de sânge (test IGRA) sau test cutanat (test tuberculină) ai aflat că ai tuberculoză latentă nu ai simptome de boală care se datorează tuberculozei. Tu nu poți răspândi aceste bacterii altor persoane.

Cu toate acestea, există riscul de a dezvolta tuberculoză mai târziu în viață, dar riscul este mic.

##### În anumite cazuri se administrează tratament preventiv

Anumitor persoane cu risc ridicat de îmbolnăvire li se oferă de obicei tratament preventiv. Acest lucru se aplică în primul rând în timpul sarcinii și după naștere, copiilor și adolescenților, precum și persoanelor cu sistemul imunitar slăbit, de exemplu în cazul tratamentelor de cancer, de diabet tratat cu insulină și în cazul bolilor renale grave. Tratamentul preventiv se administrează uneori și persoanelor care au fost recent expuse la infecția cu tuberculoză.

##### Ți se recomandă tratament preventiv

Ai tuberculoză latentă și medicul tău îți recomandă tratament preventiv. Acest lucru este recomandat pentru a reduce riscul de a te îmbolnăvi de tuberculoză în viitor.

Dacă în viitor vei avea tuse persistentă (mai mult de trei săptămâni), transpirații nocturne, febră sau pierdere involuntară în greutate, trebuie să contactezi medicul pentru a ți se face un control pentru tuberculoză

#### Date de contact (Kontaktuppgifter)

Numele cabinetului medical (*Namn på mottagningen*)

.....

Te-ai întâlnit cu: (*Du har träffat*)

..... Medic (*Läkare*)

..... Asistent medical (*Sjuksköterska*)

Număr de telefon/program contact telefonic la cabinetul medical (*Telefonnummer/telefonid till mottagningen*)

.....