

## SMITTSKYDDSBLAD

## Patientinformation

Latent tuberkulos när behandling ges

Översatt till ryska

Version 2022-04-11

**Информация для пациентов о латентном туберкулезе****В случае предоставления профилактической терапии. Информационный лист врачей-инфекционистов.****Каким образом можно заразиться туберкулезом?**

Человек, инфицированный туберкулезом в легких, может заражать других, когда он(а) кашляет в помещении. Туберкулез, инфицировавший другие органы, и латентный туберкулез не заражны. Кроме того, нетипично, чтобы дети до периода полового созревания были заражны. Риск заразиться наиболее высок, если проводишь длительное время вместе в одном помещении, например, когда проживаешь в одном домохозяйстве.

**Что такое «латентный туберкулез»?**

Все инфицированные не заболевают туберкулезом. У большинства людей иммунная защита организма позволяет остановить распространение бактерий. Бактерии могут оставаться в организме, но быть неактивными. Это состояние называют **латентным туберкулезом**.

**Латентный туберкулез не является заболеванием**

Лица, которые после сдачи анализа крови (IGRA-тест) или кожного теста (туберкулиновая проба) получили информацию о том, что имеют латентный туберкулез, не наблюдают никаких симптомов, обусловленных туберкулезом. Вы не можете передавать эти бактерии другим лицам.

При этом, однако, существует риск развития заболевания туберкулезом позже в течение жизни, но этот риск низок.

**В ряде случаев предоставляется профилактическая терапия**

Некоторым лицам с повышенным риском развития заболевания позже в течение жизни предлагается пройти профилактическую терапию. В первую очередь это касается ситуаций беременности и после родов, детей и молодежи, а также лиц с ослабленным иммунитетом, например, при онкотерапии, инсулиновом диабете, серьезном заболевании почек. Профилактическая терапия также иногда предлагается лицам, недавно подвергшимся воздействию туберкулезной инфекции.

**Вам рекомендуется пройти профилактическую терапию**

У вас латентный туберкулез, и ваш врач рекомендует терапию в целях профилактики. Это нужно для снижения риска заболевания туберкулезом в будущем.

Если в будущем у вас будет наблюдаться долговременный кашель (более трех недель), потливость по ночам, повышенная температура или непреднамеренное снижение веса, свяжитесь с врачом, чтобы вас проверили на туберкулез.

**Контактные данные (Kontaktuppgifter)**

Название медицинского отделения (*Namn på mottagningen*)

.....

Вы встречали (*Du har träffat*)

..... Врач (*Läkare*)

..... Медсестра (*Sjuksköterska*)

Номер телефона/часы приема звонков в отделении (*Telefonnummer/telefonid till mottagningen*)

.....

SMITTSKYDD SKÅNE

040–33 71 80

