

SMITTSKYDDSBLAD

Patientinformation

Latent tuberkulos när behandling ges

Översatt till spanska

Version 2022-04-11

Tuberculosis latente, información para el paciente

En qué casos se indica el tratamiento preventivo. Hoja informativa de los especialistas en control de enfermedades infecciosas.

¿Cómo se contagia la tuberculosis?

Una persona con tuberculosis en los pulmones puede contagiar a otras cuando tose en lugares cerrados. La tuberculosis en otros órganos y la tuberculosis latente no contagian. Es poco frecuente que los niños contagien antes de la pubertad. El riesgo de contagio es mayor si se pasa mucho tiempo en la misma habitación, por ejemplo, si se comparte la vivienda.

¿Qué es la tuberculosis latente?

No todos los contagiados enferman de tuberculosis. En la mayoría de las personas las defensas inmunológicas del cuerpo detienen el aumento de las bacterias. Las bacterias permanecen en el cuerpo, pero no están activas. Este estado es denominado **tuberculosis latente**.

La tuberculosis latente no es una enfermedad

Si después de un análisis de sangre (prueba IGRA) o prueba cutánea (prueba de la tuberculina) te informan que tienes tuberculosis latente, no tienes síntomas debido a la tuberculosis. No puedes propagar esas bacterias a otras personas.

No obstante, existe el riesgo de desarrollar la enfermedad de tuberculosis en otro momento de la vida, pero el riesgo es pequeño.

Tratamiento preventivo en ciertos casos

En algunos casos se ofrece un tratamiento preventivo a las personas que corren mayor riesgo de enfermarse. Es el caso del embarazo y después del parto, los niños y jóvenes y las personas con defensas inmunológicas debilitadas, por ejemplo, por tratamiento de cáncer, diabetes tratada con insulina, o enfermedad renal grave. También se brinda tratamiento preventivo a las personas que han estado expuestas recientemente al contagio de la tuberculosis.

Te han recomendado tratamiento preventivo

Tienes tuberculosis latente y tu médico ha recomendado el tratamiento de manera preventiva. Lo ha hecho para disminuir el riesgo de que enfermes de tuberculosis en el futuro.

Si en el futuro padeces de tos prolongada (durante más de tres semanas), sudoración nocturna, fiebre o disminución de peso involuntaria, contacta al médico para que examine si tienes tuberculosis.

Datos de contacto (Kontaktuppgifter)

Nombre de la clínica (*Namn på mottagningen*).....

Has visto a (*Du har träffat*)

..... Médico (*Läkare*)

..... Enfermera (*Sjuksköterska*)

No. de teléfono/horario de atención telefónica de la clínica (*Telefonnummer/telefonid till mottagningen*)

.....