

SMITTSKYDDSBLAD

Patientinformation

Latent tuberkulos när behandling ges

Översatt till ukrainska

Version 2022-04-11

Латентний туберкульоз, інформація для пацієнта**Коли проводиться профілактичне лікування. Лист лікарів інфекційного контролю****Як передається туберкульоз?**

Людина зі збудниками туберкульозу в легенях, що кашляє у замкнутому приміщенні, може заразити інших людей. Людина не заразна, якщо збудники туберкульозу знаходяться в інших органах, а не в легенях, а також у разі латентного туберкульозу. Діти до досягнення статевого дозрівання, як правило, не заразні. Ризик зараження найбільш високий у тих випадках, коли людина проводить довгий час разом із зараженим в одному приміщенні, наприклад, якщо вони проживають разом.

Що таке латентний туберкульоз?

Не всі люди, заражені на туберкульоз, хворіють на нього. У більшості людей захисні властивості організму можуть зупинити розмноження бактерій. Бактерії можуть залишатися в організмі, але в неактивному стані. Це називається **латентний туберкульоз**.

Латентний туберкульоз не є хворобою.

Якщо після аналізу крові (ІГРА-тест) або після шкірної проби (реакція Манту) у вас був виявлений латентний туберкульоз, це не означає, що у вас є якісь симптоми даної хвороби. Ви не можете заразити цими бактеріями інших людей.

Однак для вас існує ризик розвитку захворювання на туберкульоз в більш пізньому віці, хоча цей ризик невеликий.

У деяких випадках проводиться профілактичне лікування

Деяким людям із підвищеним ризиком розвитку захворювання в майбутньому пропонується профілактичне лікування. Насамперед це стосується дітей і підлітків, вагітних і жінок, які нещодавно народили, а також людей з ослабленим імунним захистом, наприклад, при лікуванні раку, при важких захворюваннях нирок і при лікуванні цукрового діабету інсуліном. Іноді профілактичне лікування пропонується людям, які нещодавно заразилися туберкульозною інфекцією.

Вам рекомендовано профілактичне лікування

У вас виявлено латентний туберкульоз і ваш лікар рекомендує розпочати лікування для профілактики хвороби. Мета лікування полягає у тому, щоб знизити ризик захворювання на туберкульоз у майбутньому.

Якщо в майбутньому у вас з'явиться тривалий кашель (більше трьох тижнів), підвищена нічна пітливість, температура або небажана втрата ваги, зверніться до лікаря для обстеження на туберкульоз.

Контактні дані (Kontaktuppgifter)

Назва клініки (*Namn på mottagningen*)

Ви зустрічалися з (*Du har träffat*)

..... Лікар (*Läkare*)

..... Медсестра (*Sjuksköterska*)

Номер телефону/час прийому дзвінків (*Telefonnummer/telefonid till mottagningen*)

.....