

SMITTSKYDDSBBLAD

Patientinformation

Latent tuberkulos när behandling ej ges

Översatt till arabiska

Version 2022-04-11

السل الكامن، معلومات المريض

عندما لا يتم تقديم العلاج الوقائي. نشر المعلومات من أطباء مكافحة انتشار الأمراض المعدية.

كيف ينتقل مرض السل؟

يمكن للشخص المصاب بمرض السل الرئوي أن ينقل العدوى إلى الآخرين عندما يعطس في الداخل. أما مرض السل في الأعضاء الأخرى ومرض السل الكامن فهما ليسا معديان. نادرًا ما يكون الأطفال الذين لم يصلوا بعد إلى سن البلوغ معديين. يكون خطر انتقال العدوى كبيرًا جدًا عند قضاء وقت طويل في نفس الغرفة، على سبيل المثال عندما يسكن بضعة أشخاص في نفس المسكن.

ما هو السل الكامن؟

لا يمرض جميع الناس الذين يصابون بالعدوى بمرض السل، حيث يمكن للجهاز المناعي لدى معظم الناس إيقاف نمو البكتيريا. وبالتالي يمكن أن تبقى البكتيريا في الجسم ولكنها لا تكون فعالة. تُعرف هذه الحالة بالسل الكامن.

السل الكامن ليس مرضًا

إذا تم إشعارك بعد إجراء فحص الدم (اختبار قياسات إطلاق إنترفيرون جاما أو IGRA) أو اختبار الجلد (اختبار جلدي لتشخيص مرض السل) أنك تعاني من السل الكامن فإنه ليس لديك أي أعراض التي تعود إلى مرض السل. ولا يمكنك نقل هذه البكتيريا إلى أشخاص آخرين.

ولكن مع ذلك يوجد خطر في أن يتطور لديك مرض السل فيما بعد في مرحلة من مراحل الحياة، ولكن الخطر ضئيلاً. لذلك فإنه في معظم الحالات لا يوجد حاجة إلى علاج أولئك الذين يعانون من السل الكامن.

يتم إعطاء علاج وقائي في بعض الحالات

يُعرض على بعض الناس الذين لديهم خطر متزايد في الإصابة بالمرض لاحقاً الحصول على علاج وقائي. ينطبق الأمر أولاً وقبل كل شيء على النساء الحوامل وبعد الولادة، وعلى الأطفال والبالغين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من جهاز مناعي ضعيف، على سبيل المثال عند الحصول على علاج ضد مرض السرطان أو مرض السكر بالأنسولين أو مرض الكلى المستعصي. كما يُعطى العلاج الوقائي أحياناً أيضاً لأشخاص تعرضوا حديثاً إلى عدوى السل.

الاتصال بالطبيب

إنك تعاني من السل الكامن، ولكن قيم طبيبك أنك لست بحاجة إلى علاج الآن. إذا تعرضت في المستقبل إلى سعال طويل الأمد (أكثر من ثلاث أسابيع)، التعرق الليلي، حمى أو فقدان وزن لا إرادي، فيجب عليك الاتصال بالطبيب لكي يتم فحصك للكشف عن مرض السل. كما يجب عليك الاتصال بالطبيب إذا أصبحت حاملاً، أو إذا أصبت بمرض السكر المعالج بالأنسولين، أو بمرض الكلى المستعصي، أو إذا بدأت بعلاج مرض السرطان أو أصبح جهازك المناعي ضعيفاً لسبب آخر. في هذه الحالات يوجد خطر متزايد في أن تصاب بمرض السل.

تفاصيل الاتصال (Kontaktuppgifter)

(Namn på mottagningen) اسم العيادة

.....

(Telefonnummer/telefonid till mottagningen) رقم الهاتف/مواعيد الاتصال بالعيادة

.....

SMITTSKYDD SKÅNE

040-33 71 80

