

SMITTSKYDDSBLAD

Patientinformation

Latent tuberkulos när behandling ej ges

Översatt till finska

Version 2022-04-11

Piilevä (latentti) tuberkuloosi, tietoa potilaille

Ajanjakso, jolloin ehkäisevää hoitoa ei anneta. Tartuntasuojalääkärien tiedote

Miten tuberkuloosi tarttuu?

Keuhkotuberkuloosia sairastava voi tartuttaa taudin muihin yskiessään sisätiloissa. Muissa elimissä oleva tuberkuloosi ja piilevä tuberkuloosi eivät tartu muihin. On harvinaista, että alle murrosikäiset lapset tartuttavat tautia. Tarttumisvaara on suurin silloin kun oleskelee pitemmän ajan samassa huoneessa, esimerkiksi samassa kotitaloudessa, kuin tartunnan saanut.

Mikä on piilevä tuberkuloosi?

Kaikki tartunnan saaneet eivät välttämättä sairastu tuberkuloosiin. Useimmilla henkilöillä kehon oma puolustuskyky pystyy estämään bakteerien kasvamisen. Bakteereja voi jäädä kehoon, mutta ne eivät ole aktiivisia. Tätä tilaa kutsutaan **piileväksi tuberkuloosiksi**.

Piilevä tuberkuloosi ei ole mikään sairaus

Sinulla, joka olet saanut verikokeen (IGRA-testi) tai ihotestin (tuberkuliinikoe) jälkeen tiedon, että sinulla on piilevä tuberkuloosi, ei ole mitään tuberkuloosista johtuvia sairauden oireita. Et pysty levittämään näitä bakteereita edelleen toisiin ihmisiin.

On kuitenkin olemassa riski tuberkuloosiin sairastumisesta elämän myöhemmässä vaiheessa, mutta se riski on vähäinen. Mitään hoitoa ei useimmissa tapauksissa tarvitse sen vuoksi antaa niille, joilla on piilevä tuberkuloosi.

Ehkäisevää hoitoa annetaan tietyissä tapauksissa

Tietyille ihmisille, joilla on lisääntynyt riski sairastua myöhemmin, tarjotaan ehkäisevää hoitoa. Tämä koskee ensisijaisesti raskausaikaa synnyttämisen jälkeen, lapsia ja nuoria sekä niitä, joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä esimerkiksi syöpähoidon, insuliinilla hoidettavan diabeteksen tai vaikean munuaissairauden aikana. Ehkäisevää hoitoa annetaan toisinaan myös niille, jotka ovat vasta altistuneet tuberkuloositartunnalle.

Yhteydenotot lääkäriin

Sinulla on piilevä tuberkuloosi, mutta et lääkärisi mielestä tarvitse hoitoa tällä hetkellä. Jos tulevaisuudessa kuitenkin saat pitkäaikaisen yskän (pitemmän kuin kolme viikkoa), yöhikoiluja, kuumetta tai laihdut sitä haluamatta, ota yhteys lääkäriisi tuberkuloositutkimuksia varten. Sinun pitää ottaa yhteys lääkäriisi myös silloin kun tulet raskaaksi tai saat diabeteksen, jota hoidetaan insuliinilla, vaikean munuaissairauden tai syöpähoitoa tai jos immuunijärjestelmäsi heikentyy jostakin muusta syystä. Näissä tilanteissa lisääntyy riski tuberkuloosiin sairastumisesta.

Yhteystiedot (Kontaktuppgifter)

Vastaanoton nimi (Namn på mottagningen)

.....

Vastaanoton puhelinnumero ja -aika (Telefonnummer/telefonid till mottagningen)

.....