

SMITTSKYDDSBLAD

Patientinformation

Latent tuberkulos när behandling ej ges

Översatt till polska

Version 2022-04-11

Gruźlica utajona, informacje dla pacjentów

Gdy nie jest prowadzone leczenie profilaktyczne. Ulotka informacyjna od lekarzy ds. kontroli zakażeń

W jaki sposób przenoszona jest gruźlica?

Osoba chora na gruźlicę płuc może zarażać innych poprzez kaszel w pomieszczeniach zamkniętych. Gruźlica w innych narządach i gruźlica utajona nie są zakaźne. Rzadko zdarza się, aby dzieci przed okresem dojrzenia zarażały. Ryzyko zarażenia jest największe, gdy ludzie przebywają przez dłuższy czas w tym samym pomieszczeniu, np. we wspólnym gospodarstwie domowym.

Czym jest gruźlica utajona?

Nie każdy, kto się zarazi, zachoruje na gruźlicę. U większości ludzi mechanizmy obronne organizmu są w stanie powstrzymać rozwój bakterii. Bakterie mogą pozostać w organizmie, ale nie są aktywne. Stan ten nazywany jest **gruźlicą utajoną**.

Gruźlica utajona nie jest chorobą

Badanie krwi (test IGRA) lub test skórny (próbna tuberkulinowa) wykazały u Ciebie gruźlicę utajoną, ale nie masz żadnych innych objawów gruźlicy. Nie przenosisz tych bakterii na inne osoby.

Istnieje jednak ryzyko zachorowania na gruźlicę w późniejszym okresie życia, ale jest ono niewielkie. Dlatego w większości przypadków osoby z utajoną gruźlicą nie wymagają leczenia.

W niektórych przypadkach stosuje się leczenie profilaktyczne

Niektórym osobom z grup podwyższonego ryzyka późniejszego zachorowania proponuje się leczenie profilaktyczne. Dotyczy to przede wszystkim kobiet w ciąży i po porodzie, dzieci i młodzieży oraz osób z osłabionym układem odpornościowym, np. w przypadku leczenia nowotworów, cukrzycy leczonej insuliną, ciężkiej choroby nerek. Czasami stosuje się również leczenie profilaktyczne u osób, które niedawno były narażone na zakażenie gruźlicą.

Kontakt z lekarzem

Masz utajoną gruźlicę, ale twój lekarz uważa, że nie potrzebujesz teraz leczenia. Jeśli w przyszłości wystąpi przedłużający się kaszel (ponad trzy tygodnie), nocne poty, gorączka lub mimowolna utrata masy ciała, należy skontaktować się z lekarzem w celu wykonania badań w kierunku gruźlicy. Należy również skontaktować się z lekarzem w przypadku zajścia w ciążę, cukrzycy leczonej insuliną, ciężkiej choroby nerek, leczenia nowotworu lub osłabienia układu odpornościowego z jakiegokolwiek innego powodu. W takich warunkach istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na gruźlicę.

Dane kontaktowe (Kontaktuppgifter)

Nazwa przychodni (*Namn på mottagningen*)

.....

Numer telefonu/godziny kontaktu telefonicznego (*Telefonnummer/telefonid till mottagningen*)