

SMITTSKYDDSBLAD

Patientinformation

Latent tuberkulos när behandling ej ska ges

Översatt till portugisiska

Version 2022-04-11

Tuberculose latente, informações para pacientes

Quando não se administra um tratamento preventivo. Ficha de informação dos médicos de prevenção e controlo de doenças infecciosas

Como a tuberculose se transmite?

Uma pessoa com tuberculose pulmonar pode contagiar outras pessoas ao tossir em espaços interiores. A tuberculose em outros órgãos do corpo e a tuberculose latente não são contagiosas. As crianças pré-púberes raramente são contagiosas. O risco de contágio é maior quando se permanece muito tempo no mesmo ambiente, por exemplo, ao partilhar a mesma habitação.

O que é a tuberculose latente?

Nem todas as pessoas infetadas com tuberculose desenvolvem a doença. Na maior parte dos casos, o sistema imunitário consegue conter a multiplicação das bactérias infecciosas. As bactérias podem permanecer no corpo, mas num estado inativo. Esta situação é denominada **tuberculose latente**.

A tuberculose latente não é uma doença

Se após uma análise sanguínea (teste IGRA) ou um teste cutâneo tuberculínico tiver sido diagnosticado(a) com tuberculose latente, isso significa que é assintomático(a) e que não pode transmitir as bactérias da tuberculose a outras pessoas.

No entanto, há o risco de desenvolver a doença na forma ativa numa fase posterior da vida, mas esse risco é pequeno. Por essa razão, na maior parte dos casos, não é necessário administrar qualquer tratamento às pessoas com tuberculose latente.

Em alguns casos é administrado um tratamento preventivo

A certas pessoas suscetíveis de contraírem a doença numa fase posterior é sugerido um tratamento de prevenção. Tal aplica-se, em primeiro lugar, em casos de gravidez e pós-parto, a crianças e adolescentes e a pessoas com sistema imunitário fragilizado, por exemplo, na sequência de tratamentos do cancro, insulíndependência ou doenças renais graves. Por vezes, o tratamento preventivo é também administrado em casos de exposição recente à infeção tuberculosa.

Contacto médico

Foi diagnosticado(a) com tuberculose latente, mas o seu médico considera que não precisa de um tratamento na fase atual. Se, no futuro, sentir sintomas como tosse persistente (durante mais de três semanas), suores noturnos, febre ou perda involuntária de peso, deve contactar o seu médico para uma consulta de rastreio de infeção tuberculosa. Deve igualmente contactar os serviços médicos em caso de gravidez, insulíndependência, doença renal grave, tratamento do cancro ou imunodeficiência por outra razão. Nos casos citados, há um risco acrescido de adoecer com tuberculose.

Dados de contacto (*Kontaktuppgifter*)

Nome do consultório (*Namn på mottagningen*)

.....

Número de telefone/horário de atendimento telefónico do consultório (*Telefonnummer/telefonid till mottagningen*)

.....